

BASE INSTRUMENTAL · EJE I: PROBLEMAS, SÍNTOMAS Y RIESGO

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL TEPT PARA EL DSM-5

(PTSD Checklist for DSM-5 — PCL-5)

Weathers, F. W., Litz, B. T., et al. (2013). National Center for PTSD. • Traducción al español validada.

Nombre y Apellido:	Edad:	Fecha:
Evaluador / Institución:	Sexo: ☐ F ☐ M	Nº H.C. / Cód.:

INSTRUCCIONES Y EVENTO TRAUMÁTICO ÍNDICE: Este cuestionario evalúa problemas experimentados tras un evento estresante muy traumático (que implicó muerte o amenaza, agresión grave o violencia sexual).

Identifique brevemente el evento traumático principal:

Teniendo este evento en mente, indique cuánto le ha molestado cada síntoma en el último mes:

0 = Nada en absoluto | 1 = Un poco | 2 = Moderadamente | 3 = Mucho | 4 = Extremadamente

Nº	En el último mes, cuánto le ha molestado:	0 Nada	1 Poco	2 Moder.	3 Mucho	4 Extr.
CRITERIO B: SÍNTOMAS DE INTRUSIÓN (Re-experimentación)						
1	Recuerdos repetitivos, involuntarios, perturbadores y no deseados de la experiencia estresante.	☐	☐	☐	☐	☐
2	Sueños o pesadillas repetitivas e inquietantes acerca del evento traumático.	☐	☐	☐	☐	☐
3	Sentir o actuar de repente como si la experiencia estuviera sucediendo de nuevo (flashbacks).	☐	☐	☐	☐	☐
4	Sentirse muy perturbado(a) o angustiado(a) emocionalmente cuando algo le recuerda el hecho.	☐	☐	☐	☐	☐
5	Reacciones físicas intensas (sudoración, taquicardia, dificultad para respirar) ante los recuerdos.	☐	☐	☐	☐	☐
CRITERIO C: SÍNTOMAS DE EVITACIÓN						
6	Evitar recuerdos, pensamientos, ideas o sentimientos relacionados con la experiencia estresante.	☐	☐	☐	☐	☐
7	Evitar recordatorios externos (personas, lugares, conversaciones, objetos o situaciones).	☐	☐	☐	☐	☐

N°	En el último mes, cuánto le ha molestado (continuación):	0 Nada	1 Poco	2 Moder.	3 Mucho	4 Extr.
CRITERIO D: ALTERACIONES COGNITIVAS Y DEL ESTADO DE ÁNIMO						
8	Dificultad para recordar partes o detalles importantes de la experiencia estresante (amnesia disociativa).	☐	☐	☐	☐	☐
9	Creencias o expectativas negativas persistentes y exageradas sobre usted mismo, los demás o el mundo.	☐	☐	☐	☐	☐
10	Culparse a sí mismo(a) o a otros de manera distorsionada por lo sucedido o por sus consecuencias.	☐	☐	☐	☐	☐
11	Experimentar constantemente estados emocionales negativos intensos (miedo, horror, enojo, culpa o vergüenza).	☐	☐	☐	☐	☐
12	Pérdida marcada de interés o participación en actividades que antes disfrutaba.	☐	☐	☐	☐	☐
13	Sentirse distante, aislado(a) o desconectado(a) de las demás personas.	☐	☐	☐	☐	☐
14	Dificultad para experimentar emociones positivas (incapacidad para sentir felicidad, amor o satisfacción).	☐	☐	☐	☐	☐
CRITERIO E: HIPERACTIVACIÓN Y REACTIVIDAD						
15	Comportamiento irritable, arrebatos de furia o agresividad hacia otros con poca o ninguna provocación.	☐	☐	☐	☐	☐
16	Tomar riesgos innecesarios o tener conductas imprudentes o autodestructivas.	☐	☐	☐	☐	☐
17	Estar en estado de alerta constante, hipervigilante o como «en guardia».	☐	☐	☐	☐	☐
18	Sobresaltarse o asustarse muy fácilmente ante ruidos o situaciones inesperadas.	☐	☐	☐	☐	☐
19	Tener dificultades para concentrarse en tareas, trabajo o lecturas.	☐	☐	☐	☐	☐
20	Dificultad para conciliar o mantener el sueño, o sueño inquieto y fragmentado.	☐	☐	☐	☐	☐

NORMAS DE CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN CLÍNICA (Rango 0 a 80 puntos):

• **Punto de corte dimensional global:** Una puntuación total *ge31*– 33 puntos indica alta probabilidad diagnóstica de Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) provisional (sensibilidad 88%, especificidad 69%). • **Criterio diagnóstico categorial DSM-5:** Un síntoma se considera presente si se puntúa con *ge2* (**Moderadamente**). Requiere: 1. Al menos **1 síntoma del Criterio B** (ítems 1–5). 2. Al menos **1 síntoma del Criterio C** (ítems 6–7). 3. Al menos **2 síntomas del Criterio D** (ítems 8–14). 4. Al menos **2 síntomas del Criterio E** (ítems 15–20).

psico-flujo · Instrumento oficial de cribado de TEPT del National Center for PTSD (Weathers et al., 2013). Libre para uso clínico.