

BASE INSTRUMENTAL · EJE I: PROBLEMAS, SÍNTOMAS Y RIESGO

CUESTIONARIO SOBRE LA SALUD DEL PACIENTE

(Patient Health Questionnaire-9 — PHQ-9)

Kroenke, K., Spitzer, R. L., & Williams, J. B. (2001). The PHQ-9. *JGIM*, 16(9), 606-613. • Versión validada en español.

Nombre y Apellido:

Edad:

Fecha:

Evaluador / Institución:

Sexo: ☐ F ☐ M

Nº H.C. / Cód.:

INSTRUCCIONES: Durante las últimas 2 semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido molestias debido a cualquiera de los siguientes problemas? Marque con una cruz su respuesta.

0 = Ningún día

1 = Varios días

2 = Más de la mitad de los días

3 = Casi todos los días

Nº	Durante las últimas 2 semanas, síntomas o molestias:	0 Ningún día	1 Varios días	2 > mitad días	3 Casi a diario
1	Poco interés o placer en hacer cosas (anhedonia).	☐	☐	☐	☐
2	Sentirse decaído(a), deprimido(a) o sin esperanzas.	☐	☐	☐	☐
3	Dificultades para conciliar o mantener el sueño, o dormir demasiado.	☐	☐	☐	☐
4	Sentirse cansado(a) o con poca energía.	☐	☐	☐	☐
5	Poco apetito o comer en exceso.	☐	☐	☐	☐
6	Sentirse mal con usted mismo(a), o que es un fracaso, o que ha defraudado a su familia o a usted mismo(a).	☐	☐	☐	☐
7	Dificultad para concentrarse en cosas, tales como leer, trabajar o ver televisión.	☐	☐	☐	☐
8	Moverse o hablar tan lentamente que otros lo noten. O lo contrario: estar tan inquieto(a) que se ha movido mucho más.	☐	☐	☐	☐
9	Pensamientos de que sería mejor estar muerto(a) o deseos de lastimarse de alguna manera.	☐	☐	☐	☐

Ítem de impacto funcional: Si marcó cualquiera de los problemas anteriores, ¿qué tanta dificultad le han causado para trabajar, cuidar la casa o relacionarse?

☐ Ninguna dificultad☐ Un poco de dificultad☐ Mucha dificultad☐ Extrema dificultad

PUNTUACIÓN TOTAL Y SEVERIDAD (0 a 27 puntos): • **0–4:** Depresión mínima/ausente. • **5–9:** Depresión leve (seguimiento). • **10–14:** Depresión moderada. • **15–19:** Depresión moderadamente grave. • **20–27:** Depresión grave (intervención inmediata multidisciplinar).

ALERTA CLÍNICA OBLIGATORIA (Ítem 9): Cualquier valor > 0 en el ítem 9 (ideación de muerte o suicidio) exige evaluación inmediata del riesgo autolítico.

psico-flujo · Instrumento de acceso abierto para cribado clínico (Kroenke et al., 2001). No reproduce contenidos comerciales.