

BASE INSTRUMENTAL · EJE I: PROBLEMAS, SÍNTOMAS Y RIESGO

ESCALA DE ESTRÉS PERCIBIDO

(Perceived Stress Scale — PSS-10)

Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. *J Health Soc Behav*, 24(4), 385-396. • Adaptación española: Remor (2006).

Nombre y Apellido:

Edad:

Fecha:

Evaluador / Institución:

Sexo:

☐ F ☐ M

Nº H.C. / Cód.:

INSTRUCCIONES: Las preguntas de esta escala hacen referencia a sus sentimientos y pensamientos durante el último mes. En cada caso, indique con qué frecuencia se sintió de esa manera:

0 = Nunca

1 = Casi nunca

2 = De vez en cuando

3 = A menudo

4 = Muy a menudo

Nº	En el último mes, ¿con qué frecuencia:	0 Nunca	1 Casi n.	2 A veces	3 A men.	4 Siempre
1	¿Ha estado afectado(a) por algo que ocurrió inesperadamente?	☐	☐	☐	☐	☐
2	¿Ha sentido que no podía controlar las cosas importantes en su vida?	☐	☐	☐	☐	☐
3	¿Se ha sentido nervioso(a) o con sensación de estrés / tensión?	☐	☐	☐	☐	☐
4	¿Ha tenido confianza en su capacidad para manejar sus problemas personales? (Inverso)	☐	☐	☐	☐	☐
5	¿Ha sentido que las cosas le estaban saliendo bien? (Inverso)	☐	☐	☐	☐	☐
6	¿Ha sentido que no podía afrontar todas las cosas pendientes que tenía que hacer?	☐	☐	☐	☐	☐
7	¿Ha sido capaz de controlar las dificultades de su vida? (Inverso)	☐	☐	☐	☐	☐
8	¿Ha sentido que tenía el control de las cosas? (Inverso)	☐	☐	☐	☐	☐
9	¿Se ha enfadado porque las cosas que le ocurrían estaban fuera de su control?	☐	☐	☐	☐	☐
10	¿Ha sentido que las dificultades se acumulaban tanto que no podía superarlas?	☐	☐	☐	☐	☐

NORMAS DE CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN CLÍNICA (Rango 0 a 40 puntos):

• **Inversión de ítems (filas en verde):** Los ítems 4, 5, 7 y 8 se invierten: 0=4, 1=3, 2=2, 3=1, 4=0. Los ítems restantes se suman directamente.

• **Puntuación total y niveles de estrés percibido:**

• **0–13 puntos:** Nivel bajo de estrés percibido.

• **14–26 puntos:** Nivel moderado de estrés percibido (frecuente en población general con sobrecarga cotidiana).

• **27–40 puntos:** Nivel alto de estrés percibido (asociado a alto riesgo de somatización, agotamiento o descompensación adaptativa).