

CUESTIONARIO DE GRAVEDAD DE LA DEPENDENCIA AL ALCOHOL (SADQ)

Severity of Alcohol Dependence Questionnaire — Versión de 33 Ítems
Stockwell, Hodgson, Edwards, Taylor & Rankin (1979, 1983) • Adaptación española: Bobes et al.

Nombre / Código: _____Fecha: _____

Edad: _____ añosSexo: ☐ F ☐ M ☐ OtroEvaluador: _____

INSTRUCCIONES:
Indique la frecuencia con que experimentó los siguientes síntomas durante el período de consumo más intenso en los últimos 6 meses (0=Nunca, 1=A veces, 2=Frecuentemente, 3=Casi siempre):
0 = Nunca o casi nunca | 1 = A veces | 2 = Frecuentemente | 3 = Casi siempre

Nº	Manifestación / Síntoma	0 Nunc	1 Veces	2 Frec	3 Siemp
A. Durante el período de mayor consumo (últimos 6 meses)					
1	Me despertaba sudando				
2	Tenía palpitaciones a primera hora de la mañana				
3	Me temblaban las manos a primera hora de la mañana				
4	Tenía náuseas a primera hora de la mañana				
5	Todo mi cuerpo temblaba violentamente si no bebía algo				
6	Me despertaba completamente bañado en sudor				
7	Vomitaba a primera hora de la mañana				
8	Temía que llegase la hora de levantarme				
9	Temía encontrarme con alguien a primera hora de la mañana				
10	Me encontraba a disgusto al despertarme por la mañana				
11	Me sentía próximo a la desesperación al despertarme				
12	Me sentía aturdido al despertarme				
13	Me sentía muy nervioso al despertarme				
14	Me sentía asustado al despertarme				
15	Me gustaba beber alcohol por la mañana				
16	Me aseguraba de que me quedara algo de alcohol para por la mañana				

Nº	Manifestación / Síntoma (continuación)	0 Nunc	1 Veces	2 Frec	3 Siemp
17	Tenía ganas de beber alcohol al despertarme				
18	Me tomaba lo antes posible y de un trago las primeras copas				
19	Consumía por lo menos 4 copas de licor en la hora tras levantarme				
20	Bebía por la mañana para calmar los temblores				
21	Sentía una fuerte necesidad de alcohol al despertarme				
22	Bebía más de 4 copas de licor al día (o 1 botella de vino / 9 cañas)				
23	Bebía más de 8 copas de licor al día (o 2 botellas de vino / 18 cañas)				
24	Bebía más de 16 copas de licor al día (o 4 botellas de vino / 36 cañas)				
25	Bebía más de 32 copas de licor al día (o 8 botellas de vino / 72 cañas)				
26	Llegaba a beber en menos de 1 hora 8 copas de licor				
27	Llegaba a beber en menos de 1 hora 16 copas de licor				
B. Reinstalación rápida tras recaída de 2 días de consumo posterior a abstinencia					
28	Por la mañana comenzaría a sudar				
29	Tendría palpitaciones				
30	Tendría temblor en las manos				
31	Tendría náuseas				
32	Mi cuerpo temblaría violentamente				
33	Mis deseos por beber alcohol serían intensos				

PUNTUACIÓN Y PUNTOS DE CORTE (Stockwell et al., 1983)**Regla de Puntuación:**

- Suma directa de los ítems de las 5 secciones (rango: **0 a 99 puntos**).
- Evalúa: Abstinencia física, Abstinencia afectiva, Consumo de alivio, Consumo típico y Reinstalación rápida.

Puntos de Corte Clínicos:

- **< 16 puntos:** Dependencia alcohólica leve.
- **16 - 30 puntos:** Dependencia alcohólica moderada.
- **31 - 44 puntos:** Dependencia alcohólica grave.
- **≥ 45 puntos:** Dependencia alcohólica muy grave (alto riesgo de delirium tremens).