

BASE INSTRUMENTAL · EJE I: PROBLEMAS, SÍNTOMAS Y RIESGO

ÍNDICE ABREVIADO DE ANSIEDAD POR LA SALUD

(Short Health Anxiety Inventory — SHAI)

Salkovskis, P. M., Rimes, K. A., Warwick, H. M., & Clark, D. M. (2002). *Behav Res Ther*, 40(12), 1405-1430. • Versión en español.

Nombre y Apellido:

Edad:

Fecha:

Evaluador / Institución:

Sexo: ☐ F ☐ M

Nº H.C. / Cód.:

INSTRUCCIONES: Por favor, lea atentamente cada afirmación e indique con qué frecuencia o intensidad se ha sentido así durante las últimas dos semanas:

0 = No / En absoluto

1 = Leve / Ocasionalmente

2 = Moderado / Frecuentemente

3 = Severo / La mayor parte del tiempo

Nº	Durante las últimas dos semanas, ítem / síntoma:	0 No	1 Leve	2 Moder.	3 Severo
1	Preocupación constante sobre mi estado de salud física habitual.	☐	☐	☐	☐
2	Notar dolores corporales y sensaciones físicas extrañas o incómodas.	☐	☐	☐	☐
3	Pensar con frecuencia que podría tener o desarrollar una enfermedad grave.	☐	☐	☐	☐
4	Dificultad para distraerme o apartar pensamientos sobre posibles enfermedades.	☐	☐	☐	☐
5	Dificultad para tranquilizarme incluso tras recibir resultados médicos normales.	☐	☐	☐	☐
6	Temor a que los médicos o pruebas no hayan detectado una enfermedad grave oculta.	☐	☐	☐	☐
7	Sentir que mi cuerpo es frágil, vulnerable o propenso a enfermarse fácilmente.	☐	☐	☐	☐
8	Preocupación anticipatoria por la posibilidad de sufrir dolores intensos o incapacitantes.	☐	☐	☐	☐
9	Creer que mi salud empeorará sensiblemente en los próximos meses o años.	☐	☐	☐	☐
10	Necesidad repetitiva de examinar mi cuerpo (palpar bultos, manchas, pulso, lunares).	☐	☐	☐	☐
11	Evitar programas de TV, noticias, lecturas o conversaciones sobre enfermedades graves.	☐	☐	☐	☐
12	Consultar repetidamente a médicos o en internet acerca de mis síntomas corporales.	☐	☐	☐	☐
13	Sentir que una enfermedad grave arruinaría por completo e irreversiblemente mi vida.	☐	☐	☐	☐
14	Pensar que la muerte por enfermedad es una posibilidad inminente y aterradora.	☐	☐	☐	☐
SECCIÓN B: CONSECUENCIAS NEGATIVAS SI ENFERMARA GRAVEMENTE					
15	Si desarrollara una enfermedad grave, creo que sería completamente incapaz de soportarlo.	☐	☐	☐	☐
16	Si me enfermara gravemente, nadie podría aliviar ni un poco mi sufrimiento.	☐	☐	☐	☐
17	Si estuviera muy enfermo(a), me convertiría en una carga insoportable para todos.	☐	☐	☐	☐
18	Si tuviera una enfermedad grave, perdería absolutamente todo lo valioso de mi vida.	☐	☐	☐	☐

NORMAS DE CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN CLÍNICA:

• **Escala Principal (Ítems 1 a 14, rango 0–42):** Evalúa la presencia y severidad de ansiedad por la salud / preocupación somática.

• **Punto de corte clínico:** *ge*18 puntos indica sospecha formal de Hipocondría / Trastorno de Ansiedad por Enfermedad (DSM-5).

• **Escala de Consecuencias Negativas (Ítems 15 a 18, rango 0–12):** Evalúa la catastrofización percibida ante un hipotético diagnóstico médico grave.

• **Puntuación Total Combinada (18 ítems, rango 0–54):** Puntuaciones *ge*27 indican ansiedad por la salud severa.

psico-flujo · Instrumento de evaluación de ansiedad por la salud (Salkovskis et al., 2002). Formato libre para uso clínico.