

ESCALA DE ANSIEDAD ANTE LA INTERACCIÓN SOCIAL

(Social Interaction Anxiety Scale - SIAS)

Mattick, R. P., & Clarke, J. C. (1998). • Bobes, J., Badía, X., Luque, A., et al. (1999).

Nombre y Apellido:

Edad:

Fecha:

Evaluador / Institución:

Sexo: ☐ F ☐ M

Nº H.C. / Cód.:

INSTRUCCIONES: Por favor, indique en qué medida cada una de las siguientes afirmaciones describe sus sentimientos o conductas en situaciones sociales, de acuerdo a la siguiente escala:

0 = Nada característico de mí | 1 = Poco característico de mí | 2 = Bastante característico de mí | 3 = Mucho / Muy característico de mí | 4 = Totalmente característico de mí

Nº	Ítem	0	1	2	3	4
1	Me pongo nervioso si tengo que hablar con alguna autoridad (maestro, jefe, etc.).	☐	☐	☐	☐	☐
2	Se me hace difícil mirar a los ojos a los demás.	☐	☐	☐	☐	☐
3	Me pongo tenso si tengo que hablar sobre mí o sobre mis sentimientos.	☐	☐	☐	☐	☐
4	Se me hace difícil socializar con las personas con las que trabajo.	☐	☐	☐	☐	☐
5	Tengo facilidad para hacer amigos de mi edad.	☐	☐	☐	☐	☐
6	Me tenso si me encuentro algún conocido en la calle.	☐	☐	☐	☐	☐
7	Cuando socializo me siento incómodo.	☐	☐	☐	☐	☐
8	Me siento tenso si estoy a solas con otra persona.	☐	☐	☐	☐	☐
9	Se me hace fácil conocer nuevas personas en fiestas, etc.	☐	☐	☐	☐	☐
10	Se me hace difícil platicar con otras personas.	☐	☐	☐	☐	☐
11	Se me hace fácil pensar en cosas sobre las cuales hablar.	☐	☐	☐	☐	☐
12	Me preocupa expresarme por temor a parecer torpe.	☐	☐	☐	☐	☐
13	Se me hace difícil estar en desacuerdo con el punto de vista de alguien más.	☐	☐	☐	☐	☐
14	Tengo dificultades para hablar con una persona atractiva del sexo opuesto.	☐	☐	☐	☐	☐
15	Me preocupo de no saber qué decir en situaciones sociales.	☐	☐	☐	☐	☐
16	Me siento nervioso al socializar con personas que no conozco bien.	☐	☐	☐	☐	☐
17	Siento que diré algo vergonzoso cuando hable.	☐	☐	☐	☐	☐
18	Cuando socializo en un grupo me preocupa que me vayan a ignorar.	☐	☐	☐	☐	☐
19	Estoy tenso cuando socializo en un grupo.	☐	☐	☐	☐	☐
20	Estoy indeciso acerca de saludar a alguien que conozco solo superficialmente.	☐	☐	☐	☐	☐

NORMAS DE CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN CLÍNICA:

e Interpretación

• Ítems inversos: 5, 9, 11 (se invierten: 0=4, 1=3, 2=2, 3=1, 4=0).

• Puntuación total: Suma de los 20 ítems (rango 0 a 80).

• Punto de corte sugerido: Una puntuación de 34 o más sugiere ansiedad social clínicamente significativa (fobia social).