

ESCALA DE INTENCIONALIDAD SUICIDA DE BECK (SIS)

Suicide Intent Scale — Evaluación tras Tentativa de Suicidio

Beck, Schuyler & Herman (1974) • Adaptación española: Bobes et al. (2002) / Viñas et al. (2004)

Nombre / Código del Paciente: _____

Fecha de Evaluación: _____

Edad: _____ años

Sexo: ☐ F ☐ M ☐ Otro

Clínico / Evaluador: _____

INSTRUCCIONES CLÍNICAS:

Escala administrada por el clínico tras una tentativa de suicidio reciente. Seleccione la opción operativa correspondiente y marque con una cruz (X) en la columna numérica (0, 1 o 2):

Nº	Dimensión Clínica y Criterios Operativos	0	1	2
PARTE I. CIRCUNSTANCIAS OBJETIVAS DE LA TENTATIVA				
1	Aislamiento en el momento del acto: 0 = Alguien presente 1 = Alguien próximo o en contacto 2 = Nadie cerca o en contacto			
2	Medición del tiempo (probabilidad de rescate fortuito): 0 = Muy probable 1 = Poco probable 2 = Altamente improbable			
3	Precauciones tomadas contra el descubrimiento/intervención: 0 = Ninguna 1 = Pasivas (ej. no avisa) 2 = Activas (ej. puerta con traba)			
4	Actuación para conseguir ayuda durante o después del acto: 0 = Avisó a alguien 1 = Contacto ambiguo 2 = No contactó ni avisó a nadie			
5	Actos finales (testamento, seguro, cartas personales): 0 = Ninguno 1 = Pensados o parciales 2 = Planes definitivos concluidos			
6	Preparación activa para la tentativa: 0 = Ninguna 1 = Mínima a moderada 2 = Importante / meticulosa			
7	Nota suicida o de despedida: 0 = Ninguna 1 = Rota, no terminada o pensada 2 = Nota redactada y presente			
8	Comunicación verbal previa de ideas o planes: 0 = No comunicación 1 = Ambigua («están mejor sin mí») 2 = Explícita («quiero morir»)			
PARTE II. EXPECTATIVAS Y SENTIMIENTOS DEL PACIENTE (AUTOINFORME)				
9	Propósito supuesto de la tentativa: 0 = Modificar el entorno / llamar atención 1 = Mixto 2 = Escapar de la vida / final absoluto			
10	Expectativas sobre la probabilidad de morir: 0 = Creía que era improbable 1 = Posible pero no segura 2 = Probable o segura			
11	Concepción sobre la letalidad del método elegido: 0 = Hizo menos de lo letal 1 = Inseguro si era mortal 2 = Excedió lo considerado mortal			
12	Seriedad de la intención de morir: 0 = No intentó seriamente acabar su vida 1 = Inseguro 2 = Intentó seriamente poner fin a su vida			
13	Actitud hacia el vivir / morir en el momento del acto: 0 = No quería morir 1 = Ambivalente / componentes de 0 y 2 2 = Deseaba morir			
14	Concepción sobre la capacidad de rescate médico: 0 = Improbable morir si recibe ayuda 1 = Incierto 2 = Seguro de morir aún con ayuda			
15	Grado de premeditación de la tentativa: 0 = Impulsiva, no premeditada 1 = Pensada < 3 horas 2 = Premeditada > 3 horas			
PARTE III. CIRCUNSTANCIAS SUBJETIVAS Y FACTORES CONTEXTUALES				
16	Reacción emocional frente al fracaso del intento: 0 = Arrepentido/a, vergüenza 1 = Acepta tanto el intento como el fracaso 2 = Rechaza el fracaso			
17	Preconcepciones sobre la muerte: 0 = Vida tras la muerte 1 = Fin absoluto / descanso 2 = Sin pensamientos sobre la muerte			
18	Número de tentativas de suicidio previas: 0 = Ninguna 1 = 1 o 2 previas 2 = 3 o más previas			
19	Consumo de alcohol en relación con el intento: 0 = Sin ingesta / irrelevante 1 = Ingesta deterioró juicio 2 = Bebió expresamente para atreverse			
20	Consumo de otras sustancias en relación con el intento: 0 = Sin ingesta / irrelevante 1 = Deterioró juicio 2 = Consumió expresamente para atreverse			

CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN CLÍNICA (Beck et al., 1974)**Regla de Puntuación:**

- Cada ítem puntúa de **0 a 2** según la columna seleccionada.
- **Puntuación de Intencionalidad Estándar:** Suma de los primeros 15 ítems (Partes I y II, rango: **0 a 30 puntos**).
- **Puntuación Total Ampliada:** Suma de los 20 ítems (rango: **0 a 40 puntos**).

Nivel de Intencionalidad Suicida (ítems 1 al 15):

- **0 a 9 puntos: Intencionalidad baja.**
- **10 a 19 puntos: Intencionalidad media.**
- **20 a 30 puntos: Intencionalidad alta / riesgo extremo de repetición letal.**

Alerta clínica: La intencionalidad alta predice de forma directa reintentos graves en los siguientes 6–12 meses.