

INVENTARIO DE FOBIA SOCIAL (SPIN)

Social Phobia Inventory — Escala de Autoinforme de 17 Ítems

Connor et al. (2000) • Validación española: Bobes et al. (1999)

Nombre / Código: _____

Fecha: _____

Edad: _____ años

Sexo: ☐ F ☐ M ☐ Otro

Evaluador: _____

INSTRUCCIONES:

Por favor, señale cuánto le han molestado los siguientes problemas durante la **última semana**, marcando con una cruz (X) en la columna numérica que mejor describa su experiencia. Marque solo una opción por ítem:

0 = Nada | 1 = Un poco | 2 = Algo | 3 = Mucho | 4 = Extremadamente

Nº	Situación / Síntoma	0	1	2	3	4
1	Tengo miedo a las personas con autoridad.					
2	Me molesta ruborizarme delante de la gente.					
3	Las fiestas y los acontecimientos sociales me dan miedo.					
4	Evito hablar con personas desconocidas.					
5	Me da mucho miedo ser criticado/a.					
6	Por temor a hacer el ridículo evito hacer cosas o hablar con la gente.					
7	Sudar en público me produce malestar o inquietud.					
8	Evito acudir a reuniones o acontecimientos sociales.					
9	Evito las actividades en las que soy el centro de atención.					
10	Hablar con personas extrañas me atemoriza.					
11	Evito dar discursos, hablar o hacer presentaciones en público.					
12	Haría cualquier cosa con tal de evitar ser criticado/a.					
13	Me asustan las palpitaciones cuando estoy rodeado/a de gente.					
14	Temo realizar tareas cuando otras personas pueden estar mirándome.					
15	Entre mis mayores miedos están hacer el ridículo o parecer torpe.					
16	Evito hablar con cualquier figura de autoridad.					
17	Temblar o notar sacudidas musculares delante de otros me genera angustia.					

CORRECCIÓN, PUNTOS DE CORTE E INTERPRETACIÓN CLÍNICA (Bobes et al., 1999; Connor et al., 2000)**Regla de Puntuación:**

- Cada ítem puntúa de **0 a 4** según la columna marcada.
- Puntuación Total:** Suma directa de los 17 ítems. Rango: **0 a 68 puntos**.
- Subescalas:** Miedo (ítems 1, 3, 5, 10, 14, 15), Evitación (ítems 4, 6, 8, 9, 11, 16) y Malestar fisiológico (ítems 2, 7, 13, 17).

Puntos de Corte e Intensidad Clínica:

- ≤ 20 puntos:** Ausencia de fobia social / Síntomas no significativos.
- 21 a 30 puntos:** Fobia social leve.
- 31 a 40 puntos:** Fobia social moderada.
- 41 a 50 puntos:** Fobia social grave.
- ≥ 51 puntos:** Fobia social muy grave.

Nota clínica: El punto de corte óptimo para cribado es **≥ 19/20** (Sensibilidad 89%, Especificidad 90%).