

ESCALA DE 8 ÍTEMS PARA RESULTADOS DEL TRATAMIENTO DEL TEPT (TOP-8)

Treatment Outcome PTSD Scale — Monitorización Breve y Sensible al Cambio en TEPT

Jonathan R. T. Davidson y James T. Colket (1997)

Nombre / Código: _____ **Fecha:** _____

Edad: _____ años **Sexo:** ☐ F ☐ M ☐ Otro **Evaluador:** _____

INSTRUCCIONES:

Heteroaplicada por el clínico tras identificar el trauma índice. Valore la severidad de cada síntoma durante la última semana puntuando de 0 a 4:

0 = Nada | 1 = Leve / Infrecuente | 2 = Moderado (>=1/sem) | 3 = Grave (>=4/sem) | 4 = Extremo / Diario

Nº	Síntoma Nuclear de TEPT Monitorizado	0	1	2	3	4
1	Imágenes dolorosas, pensamientos o recuerdos involuntarios del trauma (0=Nada a 4=Diariamente o extremo)					
2	Respuesta física ante estímulos asociados (sudor, taquicardia, opresión) (0=Nada a 4=Marcado / Muy estresante)					
3	Evitación de lugares, personas, conversaciones o actividades que recuerdan el suceso (0=No evita a 4=Extremo)					
4	Pérdida de interés y anhedonia en actividades que antes disfrutaba (0=Sin pérdida a 4=Casi todas)					
5	Sentimientos de distanciamiento o enajenación respecto a las demás personas (0=Ninguno a 4=Aislamiento total)					
6	Dificultad para conciliar o mantener el sueño reparador (0=Sin problemas a 4=Insomnio severo incapacitante)					
7	Irritabilidad o accesos de ira incontrolada (0=Ninguna a 4=Accesos diarios destructivos)					
8	Respuesta de sobresalto exagerada ante ruidos o estímulos inesperados (0=Normal a 4=Extrema / Alarma constante)					

PUNTUACIÓN Y MONITORIZACIÓN TERAPÉUTICA (TOP-8)

Puntuación Total (0 - 32 puntos):

- Suma de los 8 ítems evaluados.
- **0 - 7 puntos:** Remisión clínica / Síntomas mínimos.
- **8 - 14 puntos:** TEPT leve.
- **15 - 22 puntos:** TEPT moderado.
- **>= 23 puntos:** TEPT severo.

Sensibilidad al Cambio y Eficacia:

- Diseñada específicamente para medir respuesta terapéutica a fármacos e intervenciones psicoterapéuticas.
- **Criterio de respuesta clínica:** Reducción $\geq 50\%$ respecto al valor basal.