

BASE INSTRUMENTAL · EJE I: PROBLEMAS, SÍNTOMAS Y RIESGO

ÍNDICE DE WHITELEY DE HIPOCONDRIÁ

(Whiteley Index of Hypochondriasis — WI)

Pilowsky, I. (1967). Dimensions of hypochondriasis. *Br J Psychiatry*, 113(494), 89-93. • Adaptación española (14 ítems).

Nombre y Apellido:	Edad:	Fecha:
Evaluador / Institución:	Sexo: ☐ F ☐ M	Nº H.C. / Cód.:

INSTRUCCIONES: Por favor, responda SÍ o NO a cada una de las siguientes preguntas, pensando en cómo se ha sentido habitualmente durante los últimos meses:

Nº	Pregunta / Ítem:	SÍ	NO
1	¿A menudo se preocupa por la posibilidad de padecer una enfermedad grave?	☐	☐
2	¿Sufre frecuentemente de dolores y achaques diversos en su cuerpo?	☐	☐
3	¿A menudo se da cuenta de distintos síntomas o sensaciones que ocurren en su cuerpo?	☐	☐
4	¿Se considera una persona que está muy preocupada por su salud?	☐	☐
5	¿Con frecuencia experimenta sensaciones de enfermedades que podrían ser muy graves?	☐	☐
6	¿Si se entera de alguna enfermedad (por noticias, TV o conocidos), se preocupa por poder padecerla?	☐	☐
7	¿Cuando está enfermo, se molesta si alguien le dice que tiene mejor aspecto? (Inverso)	☐	☐
8	¿Se encuentra mal o incómodo por muchos síntomas físicos diferentes a la vez?	☐	☐
9	¿Le resulta fácil olvidarse de sí mismo(a) y pensar en cualquier otra cosa? (Inverso)	☐	☐
10	¿Le cuesta creer al médico cuando le asegura que no tiene ningún motivo para preocuparse?	☐	☐
11	¿Tiene la sensación de que las personas no se toman suficientemente en serio sus síntomas?	☐	☐
12	¿Cree que se preocupa por su salud mucho más que la mayoría de la gente?	☐	☐
☐ 13		¿Cree que hay algo que funciona francamente mal en el interior de su cuerpo?	☐
☐ 14		¿Siente un miedo persistente a las enfermedades o a contraerlas?	☐
☐			

NORMAS DE CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN CLÍNICA (Rango 0 a 14 puntos):

- **Corrección dicotómica:** Cada respuesta «SÍ» suma 1 punto, excepto en los ítems invertidos **7 y 9**, donde la respuesta «NO» suma 1 punto (en verde).
- **Punto de corte clínico:** Puntuación total **ge7 puntos** indica preocupación hipocondríaca significativa; puntuaciones **ge8 — 9 puntos** son altamente sugestivas de Hipocondría / Trastorno de Síntomas Somáticos (especificidad > 85%).
- **Factores evaluados:** 1. Preocupación por la enfermedad (ítems 1, 4, 6, 12, 14); 2. Convicción de enfermedad (ítems 2, 5, 8, 10, 13); 3. Fobia a la enfermedad e hipervigilancia somática (ítems 3, 7, 9, 11).

psico-flujo · Instrumento clásico de cribado de hipocondría (Pilowsky, 1967). Formato institucional para uso clínico libre.