

ESCALA DE OBSESIONES Y COMPULSIONES DE YALE-BROWN (Y-BOCS)

Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale — Evaluación de la Gravedad del Trastorno Obsesivo-Compulsivo

Wayne K. Goodman et al. (1989) • Adaptación clínica validada

Nombre / Código: _____

Fecha: _____

Edad: _____ años

Sexo: ☐ F ☐ M ☐ Otro

Evaluador: _____

INSTRUCCIONES:

Heteroaplicada por el clínico tras identificar obsesiones y compulsiones diana. Evalúe la última semana puntuando de 0 (Ninguno) a 4 (Extremo). Los ítems 1 a 10 determinan la puntuación nuclear:

0 = Ninguno | 1 = Leve | 2 = Moderado | 3 = Severo | 4 = Extremo / Invalidante

Nº	Dimensión Evaluada (Obsesiones, Compulsiones y Rasgos)	0	1	2	3	4
1	Tiempo ocupado por pensamientos obsesivos (0=Ninguno, 1=< 1h/día, 2=1-3h/día, 3=3-8h/día, 4=>8h/día)					
2	Interferencia producida por las obsesiones en vida social/laboral (0=Ninguna a 4=Incapacitante)					
3	Angustia y malestar subjetivo causado por las obsesiones (0=Ninguno a 4=Angustia constante extrema)					
4	Resistencia frente a las obsesiones (0=Siempre se resiste a 4=Cede completamente a todas las obsesiones)					
5	Control sobre los pensamientos obsesivos (0=Control completo a 4=Sin control alguno, dominado)					
6	Tiempo dedicado a realizar conductas compulsivas (0=Ninguno, 1=< 1h/día, 2=1-3h/día, 3=3-8h/día, 4=>8h/día)					
7	Interferencia producida por las conductas compulsivas (0=Ninguna a 4=Incapacitante)					
8	Angustia experimentada si se impide o retrasa la compulsión (0=Ninguna a 4=Angustia extrema / pánico)					
9	Resistencia frente a las compulsiones (0=Siempre se resiste a 4=Cede completamente sin oponerse)					
10	Control sobre las conductas compulsivas (0=Control completo a 4=Sin control alguno / involuntario)					
11	Insight o conciencia de enfermedad respecto a lo absurdo de las obsesiones (0=Excelente a 4=Ausente / delirante)					
12	Conductas de evitación de situaciones desencadenantes (0=Ninguna a 4=Evitación muy extendida e invalidante)					
13	Indecisión patológica (0=Ninguna a 4=Incapaz de tomar la más mínima decisión cotidiana)					
14	Sentido excesivo de responsabilidad culposa (0=Normal a 4=Se culpa de catástrofes ajenas irreales)					
15	Enlentecimiento motor obsesivo (0=Ritmo normal a 4=Enlentecimiento psicomotriz extremo por rituales)					
16	Duda patológica obsesiva (0=Ninguna a 4=Duda constante e invalidante sobre actos ejecutados)					

PUNTUACIÓN NUCLEAR Y PUNTOS DE CORTE (Goodman et al., 1989)

Puntuación Y-BOCS Nuclear (ítems 1 a 10):

- **Subtotal Obsesiones (ítems 1 a 5):** 0 a 20 puntos.
- **Subtotal Compulsiones (ítems 6 a 10):** 0 a 20 puntos.
- **Total Y-BOCS:** Suma de obsesiones + compulsiones (0 a 40 puntos).
- **0 - 7 puntos:** Subclínico / Normal.
- **8 - 15 puntos:** TOC leve.

Gravedad Clínica y Respuesta Terapéutica:

- **16 - 23 puntos:** TOC moderado (criterio estándar de entrada a ensayos clínicos).
- **24 - 31 puntos:** TOC grave.
- **32 - 40 puntos:** TOC extremo / incapacitante.
- **Respuesta clínica:** Reducción $\geq 25 - 35\%$ de la puntuación basal. Remisión: ≤ 12 puntos.