

BASE INSTRUMENTAL · EJE II: PROCESOS PSICOLÓGICOS

CUESTIONARIO DE ACEPTACIÓN Y ACCIÓN - II

(Acceptance and Action Questionnaire-II — AAQ-II)

Bond, F. W., et al. (2011). *Behav Ther*, 42(4), 676-688. • Adaptación española: Ruiz, Langer, Luciano, et al. (2013).

Nombre y Apellido:	Edad:	Fecha:
Evaluador / Institución:	Sexo: ☐ F ☐ M	Nº H.C. / Cód.:

INSTRUCCIONES: A continuación encontrará una serie de afirmaciones. Por favor, califique en qué medida cada una de ellas es verdadera para usted, utilizando una escala del 1 al 7:

1 = Nunca es verdad | 2 = Raras veces | 3 = Pocas veces | 4 = A veces es verdad | 5 = Frecuentemente | 6 = Casi siempre | 7 = Siempre

Nº	Afirmación:	1	2	3	4	5	6	7
1	Mis experiencias y recuerdos dolorosos me dificultan llevar la vida que me gustaría.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Tengo miedo de mis propios sentimientos o estados emocionales.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Me preocupa no ser capaz de controlar mis preocupaciones y sentimientos.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	Mis recuerdos dolorosos me impiden llevar una vida plena y con sentido.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	Mis emociones interfieren con la forma en que me gustaría que fuera mi vida.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6	Parece que la mayoría de las personas gestionan su vida mucho mejor que yo.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7	Las preocupaciones interfieren con mis metas y con mi rendimiento habitual.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

NORMAS DE CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN CLÍNICA (Rango 7 a 49 puntos):

• **Puntuación total:** Suma directa de las puntuaciones de los 7 ítems (sin ítems invertidos). • **Constructo medido:** Evalúa la inflexibilidad psicológica y la evitación experiencial (resistencia a experimentar sensaciones/pensamientos difíciles y tendencia a limitar la conducta comprometida con valores). • **Puntos de corte e interpretación clinimétrica:** • **7–19 puntos:** Flexibilidad psicológica saludable; baja interferencia emocional. • **20–24 puntos:** Inflexibilidad psicológica moderada; riesgo incipiente de malestar adaptativo. • **ge24–28 puntos:** Nivel clínicamente significativo de inflexibilidad psicológica (asociado a trastornos de ansiedad, depresión, dolor crónico y sufrimiento psicológico transdiagnóstico).

psico-flujo · Medida estándar en Terapias de Tercera Generación / Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT). Libre para uso clínico.