

BASE INSTRUMENTAL · EJE II: PROCESOS PSICOLÓGICOS

ESCALA DE INTOLERANCIA A LA INCERTIDUMBRE

(Intolerance of Uncertainty Scale – IUS-12 Abreviada)

Carleton, R. N., Norton, M. A., & Asmundson, G. J. (2007). *J Anxiety Disord*, 21(1), 105-117. • Adaptación al español validada.

Nombre y Apellido:	Edad:	Fecha:
Evaluador / Institución:	Sexo: ☐ F ☐ M	Nº H.C. / Cód.:

INSTRUCCIONES: Por favor, indique en qué medida cada una de las siguientes afirmaciones describe cómo reacciona usted habitualmente ante la incertidumbre:

1 = Nada característico | 2 = Poco característico | 3 = Algo característico | 4 = Muy característico | 5 = Totalmente característico

Nº	Afirmación:	1	2	3	4	5
FACTOR 1: ANSIEDAD PROSPECTIVA (Preocupación anticipatoria y necesidad de previsibilidad)						
1	Los imprevistos me disgustan y me alteran profundamente.	☐	☐	☐	☐	☐
2	Me frustra no tener toda la información que necesito antes de actuar.	☐	☐	☐	☐	☐
3	Siento que debería ser capaz de organizar y prever todo de antemano.	☐	☐	☐	☐	☐
4	No saber qué va a pasar en el futuro me impide disfrutar plenamente del presente.	☐	☐	☐	☐	☐
5	Siempre quiero saber con absoluta seguridad qué me depara el porvenir.	☐	☐	☐	☐	☐
6	No poder predecir el futuro me genera una profunda sensación de inquietud.	☐	☐	☐	☐	☐
7	Me angustia mucho la sola posibilidad de que ocurran sorpresas o hechos inesperados.	☐	☐	☐	☐	☐
FACTOR 2: ANSIEDAD INHIBITORIA (Parálisis de la acción ante la duda)						
8	Cuando llega el momento de actuar, la incertidumbre me paraliza.	☐	☐	☐	☐	☐
9	Cuando no estoy seguro(a) de algo, siento que no puedo funcionar adecuadamente.	☐	☐	☐	☐	☐
10	La más mínima duda puede hacer que me bloquee o me impida tomar decisiones.	☐	☐	☐	☐	☐
11	La incertidumbre me hace sentir vulnerable, inseguro(a) o desanimado(a).	☐	☐	☐	☐	☐
12	Me resulta francamente insoportable la falta de certeza o claridad en una situación.	☐	☐	☐	☐	☐

NORMAS DE CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN CLÍNICA (Rango 12 a 60 puntos):

• **Ansiedad Prospectiva (ítems 1 al 7, rango 7–35):** Mide el anhelo cognitivo de certidumbre y la preocupación activa orientada al futuro. • **Ansiedad Inhibitoria (ítems 8 al 12, rango 5–25):** Mide el bloqueo conductual y la incapacidad de actuar en presencia de ambigüedad o duda. • **Puntuación Total de Intolerancia a la Incertidumbre:** Suma de los 12 ítems. Puntuaciones altas (> 36 – 40) reflejan una vulnerabilidad transdiagnóstica nuclear en Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG), TOC y Trastornos de la Conducta Alimentaria.