

ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD GLOBAL (EEAG / GAF)

Global Assessment of Functioning — Eje V del DSM-IV-TR

Endicott, Spitzer, Fleiss & Cohen (1976); APA (1994, 2000)

Nombre / Código: _____

Fecha: _____

Edad: _____ años

Sexo: ☐ F ☐ M ☐ Otro

Evaluador: _____

INSTRUCCIONES:

Considere la actividad psicológica, social y laboral a lo largo de un continuum salud-enfermedad (excluyendo limitaciones ambientales o físicas). Seleccione el decil que mejor describa al paciente y anote la puntuación exacta de 1 a 100:

Puntuación continua de 1 (máxima gravedad / riesgo vital) a 100 (actividad óptima / sin síntomas)

Decil	Descripción del Nivel de Funcionamiento Psicológico, Social y Laboral (DSM-IV)	Marca
100 - 91	Actividad satisfactoria en una amplia gama de actividades, nunca parece superado por los problemas de su vida, es valorado por los demás a causa de sus abundantes cualidades positivas. Sin síntomas.	
90 - 81	Síntomas ausentes o mínimos (p. ej., ligera ansiedad antes de un examen), buena actividad en todas las áreas, interesado e implicado en una amplia gama de actividades, socialmente eficaz, satisfecho con su vida.	
80 - 71	Si existen síntomas, son transitorios y reacciones esperables ante estresantes psicosociales (p. ej., dificultades de concentración tras discusión familiar); sólo ligera alteración social, laboral o escolar.	
70 - 61	Algunos síntomas leves (p. ej., humor depresivo e insomnio ligero) o alguna dificultad en la actividad social, laboral o escolar, pero en general funciona bastante bien y mantiene relaciones significativas.	
60 - 51	Síntomas moderados (p. ej., afecto aplanado y lenguaje circunstancial, crisis de angustia ocasionales) o dificultades moderadas en la actividad social, laboral o escolar (p. ej., pocos amigos, conflictos laborales).	
50 - 41	Síntomas graves (p. ej., ideación suicida, rituales obsesivos graves, robos en tiendas) o cualquier alteración grave de la actividad social, laboral o escolar (p. ej., sin amigos, incapaz de mantener un empleo).	
40 - 31	Alguna alteración de la verificación de la realidad o de la comunicación (p. ej., lenguaje ilógico, oscuro o irrelevante) o alteración importante en varias áreas (trabajo, escuela, relaciones, juicio, estado de ánimo).	
30 - 21	La conducta está considerablemente influida por ideas delirantes o alucinaciones, o existe una alteración grave de la comunicación o del juicio o incapacidad para funcionar en casi todas las áreas.	
20 - 11	Algún peligro de causar lesiones a otros o a sí mismo (p. ej., intentos de suicidio sin expectativa manifiesta de muerte; frecuentemente violento; excitación maníaca) u ocasionalmente no mantiene higiene personal.	
10 - 1	Peligro persistente de lesionar gravemente a otros o a sí mismo (p. ej., violencia recurrente) o incapacidad manifiesta para mantener la higiene personal mínima o acto suicida grave con expectativa clara de muerte.	
0	Información inadecuada / no valorable.	

Puntuación EEAG Actual: _____ (1 - 100)

Mayor nivel en el último año: _____ (1 - 100)

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y UTILIDAD CLÍNICA (APA)

Instrucciones de Evaluación:

- Evalúe el período actual o el nivel funcional del último mes.
- Si la gravedad sintomática y el nivel funcional difieren, **la puntuación final siempre refleja el nivel más bajo (peor).**
- Registre también la puntuación más alta alcanzada en el último año.

Puntos de Corte Operativos:

- > 70: Buen funcionamiento psicofisiológico.
- 51 - 70: Síntomas / deterioro moderado o leve.
- ≤ 50: **Deterioro grave**; requiere supervisión clínica o tratamiento intensivo / hospitalario.