

ESCALA DE DISCAPACIDAD DE LA OMS (WHO-DAS)

World Health Organization Disability Assessment Schedule — Valoración Clínica
Organización Mundial de la Salud (1988) • Adaptación española: Vázquez-Barquero et al.

Nombre / Código: _____

Fecha: _____

Edad: _____ años

Sexo: ☐ F ☐ M ☐ Otro

Evaluador: _____

INSTRUCCIONES:
Indique el grado de discapacidad del paciente en cada área de funcionamiento durante el último mes (0=Ninguna, 1=Mínima, 2=Leve, 3=Moderada, 4=Grave, 5=Máxima):

0 = Sin discapacidad

|

1-2 = Leve

|

3 = Moderada

|

4 = Grave

|

5 = Máxima / Dependencia total

Área de Funcionamiento Específico	0 Ninguna	1 Mínima	2 Leve	3 Mod.	4 Grave	5 Máxima
A) Cuidado personal Higiene personal, vestirse, asearse, alimentarse de forma autónoma.						
B) Funcionamiento ocupacional Rendimiento en empleo remunerado, estudios o tareas domésticas principales.						
C) Funcionamiento familiar Interacción y convivencia con cónyuge, padres, hijos y núcleo familiar.						
D) Funcionamiento social amplio Participación comunitaria, actividades recreativas, relaciones con amigos.						
VALORACIÓN GLOBAL DE DISCAPACIDAD						
E) Discapacidad global Grado de restricción y desventaja psicosocial integral del individuo.						

INTERPRETACIÓN Y PUNTUACIÓN (OMS / Vázquez-Barquero et al.)

Estructura de la Escala:

- Evalúa 4 dimensiones específicas más una valoración global en escala Likert de 0 a 5.
- **Puntuación Total:** Suma de las 4 áreas específicas (rango: **0 a 20 puntos**).
- Permite un perfil dimensional del impacto psicosocial.

Niveles de Discapacidad Funcional:

- **0 - 4 puntos:** Funcionamiento adaptativo conservado.
- **5 - 9 puntos:** Discapacidad leve a moderada.
- **≥ 10 puntos:** Discapacidad psicosocial grave; subsidiaria de programas de rehabilitación y apoyo psicosocial.