

CUESTIONARIO DE FALLOS COGNITIVOS (CFQ)

Protocolo de Autoinforme — 25 Reactivos

D. E. Broadbent, P. F. Cooper, P. FitzGerald & K. R. Parkes (1982) • Adaptación española • Eje V

Paciente / Código:	Edad:	Sexo: ☐ M ☐ F	Fecha:
Evaluable/a:	N.º Historia:	Ocupación:	Ámbito: Neuropsicológico / Laboral

INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE: Las siguientes preguntas se refieren a pequeños despistes o errores cotidianos que todas las personas cometen en ocasiones. Por favor, indique con qué frecuencia le han ocurrido estas situaciones durante los **últimos 6 meses**, marcando con una cruz o un círculo el número correspondiente:

0 = Nunca • 1 = Rara vez • 2 = Ocasionalmente / A veces • 3 = Con bastante frecuencia • 4 = Muy frecuentemente.

N.º	Situación o Despiste Cotidiano Evaluado	Dimensión	Frecuencia (0 a 4)
1	¿Lee algo y se da cuenta de que no estaba prestando atención y tiene que volver a leerlo?	Distracción	0 1 2 3 4
2	¿Olvida si ha apagado las luces, cerrado la llave del gas o cerrado la puerta con llave?	Distracción	0 1 2 3 4
3	¿Olvida para qué iba a una habitación cuando llega a ella?	Memoria	0 1 2 3 4
4	¿Pasa de largo señales de tráfico, calles o giros que tenía previsto tomar?	Visomotor	0 1 2 3 4
5	¿Confunde la izquierda con la derecha al dar o seguir indicaciones de orientación?	Memoria	0 1 2 3 4
6	¿Choca contra personas u objetos sin querer mientras camina?	Visomotor	0 1 2 3 4
7	¿No ve algo que busca en un supermercado o estantería aunque esté justo delante?	Distracción	0 1 2 3 4
8	¿Se encuentra de repente sin recordar qué estaba haciendo o qué iba a hacer a continuación?	Memoria	0 1 2 3 4
9	¿Se le caen cosas de las manos involuntariamente o tropieza torpemente?	Visomotor	0 1 2 3 4
10	¿Olvida citas, turnos médicos o compromisos previamente agendados?	Distracción	0 1 2 3 4
11	¿Se le olvida a qué venía una persona que le estaba buscando o llamando?	Distracción	0 1 2 3 4
12	¿Olvida dónde ha dejado objetos cotidianos como llaves, cartera o el teléfono móvil?	Memoria	0 1 2 3 4
13	¿Tira la cosa equivocada (p. ej., tirar el billete y guardar el envoltorio de la basura)?	Visomotor	0 1 2 3 4
14	¿Se queda soñando despierto/a cuando debería estar concentrado/a en una tarea?	Distracción	0 1 2 3 4
15	¿Tiene problemas para encontrar la palabra adecuada al hablar o usa palabras equivocadas?	Comunicación	0 1 2 3 4
16	¿Olvida los nombres de personas conocidas a las que ve habitualmente?	Memoria	0 1 2 3 4
17	¿Le cuesta orientarse o se desorienta momentáneamente en lugares que conoce bien?	Visomotor	0 1 2 3 4
18	¿Le cuesta concentrarse o se distrae fácilmente cuando debe hacer más de una cosa?	Distracción	0 1 2 3 4
19	¿Usa términos genéricos ("eso", "la cosa") porque no le viene la palabra correcta?	Comunicación	0 1 2 3 4
20	¿Dice algo y se da cuenta enseguida de que ha dicho una inconveniencia o tontería?	Comunicación	0 1 2 3 4
21	¿Olvida recados, mensajes o encargos importantes que le habían pedido que transmitiera?	Memoria	0 1 2 3 4
22	¿Responde precipitadamente antes de que la otra persona termine de formular la pregunta?	Comunicación	0 1 2 3 4
23	¿Le cuesta tomar decisiones en situaciones cotidianas simples (menús, ropa, compras)?	Memoria	0 1 2 3 4
24	¿Tropieza con desniveles, bordillos o escalones por no haber mirado hacia abajo?	Visomotor	0 1 2 3 4
25	¿Pierde el hilo de una conversación o se olvida de lo que estaba diciendo a mitad de frase?	Comunicación	0 1 2 3 4

NORMAS DE CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN CLÍNICA (Broadbent et al., 1982):

- **Puntuación Total del CFQ:** Suma directa de las puntuaciones de los 25 reactivos (Rango: **0 a 100 puntos**).
- **Composición de Subescalas Factoriales:**
 - **Distracción y Lapsus Atencionales:** Ítems 1, 2, 7, 10, 11, 14, 18 (Rango: 0 a 28 puntos).
 - **Fallos de Memoria Cotidiana:** Ítems 3, 5, 8, 12, 16, 21, 23 (Rango: 0 a 28 puntos).
 - **Deslices Visomotores y Espaciales:** Ítems 4, 6, 9, 13, 17, 24 (Rango: 0 a 24 puntos).
 - **Lapsus de Comunicación y Nombres:** Ítems 15, 19, 20, 22, 25 (Rango: 0 a 20 puntos).
- **Estratificación Normativa (Adultos 18–65 años, Media approx 34, DE approx 12):**
 - **0 a 25 puntos:** Nivel bajo de fallos cotidianos / Rendimiento cognitivo ejecutivo muy eficiente.
 - **26 a 45 puntos:** Rango normativo promedio / Despistes habituales de la vida diaria sin significación clínica.
 - **46 a 55 puntos:** Fallos cognitivos elevados / Posible sobrecarga atencional, fatiga crónica, estrés o rumiación ansiosa.
 - **56 a 100 puntos:** **Susceptibilidad patológica a fallos cognitivos** (Percentil > 90). Alta correlación con riesgo de accidentes laborales/viales, quejas cognitivas subjetivas de deterioro neurocognitivo o afectación frontal por patología neuropsiquiátrica.