

ESCALA DE ACATISIA DE BARNES (BARS)

Barnes Akathisia Rating Scale — Evaluación de Efectos Extrapiramidales

Barnes (1989) • Instrumento de referencia para acatisia inducida por antipsicóticos

Nombre / Código: _____

Fecha: _____

Edad: _____ años

Sexo: ☐ F ☐ M ☐ Otro

Evaluador: _____

INSTRUCCIONES:

Observe al paciente sentado y de pie durante un mínimo de 2 minutos en cada postura. Complete la evaluación mediante entrevista sobre vivencia interna de inquietud y asigne la puntuación en cada apartado:

Ítems 1-3: Puntuación 0 a 3 | Ítem 4 (Global): Puntuación 0 a 5

1. CRITERIOS OBJETIVOS (Observación)

Observar al paciente sentado y de pie mínimo 2 min en cada postura.

Pto	Descripción de signos	Marca
0	Normal; ocasionalmente movimientos nerviosos.	
1	Movimientos de inquietud característicos (arrastrar pies, balanceo) presentes < 50% del tiempo.	
2	Movimientos característicos presentes durante > 50% del tiempo de observación.	
3	Movimientos constantes; incapaz de mantenerse sentado o de pie sin deambular.	

2. CONSCIENCIA DE LA INQUIETUD (Subjetivo)

Referido por el paciente durante la entrevista clínica.

Pto	Nivel de consciencia interna	Marca
0	Ausencia de inquietud interna.	
1	Sensación no específica de inquietud interna.	
2	Consciencia de incapacidad de tener piernas quietas o deseo de moverlas; empeora al estar quieto.	
3	Intensa compulsión a moverse o fuerte deseo de deambular la mayor parte del tiempo.	

3. MALESTAR POR LA INQUIETUD (Subjetivo)

Grado de angustia o estrés atribuido a la necesidad de moverse.

Pto	Grado de distrés / malestar	Marca
0	Ausencia de estrés o malestar.	
1	Leve distrés.	
2	Moderado distrés.	
3	Grave distrés.	

4. VALORACIÓN CLÍNICA GLOBAL DE ACATISIA

Juicio global del clínico integrando signos objetivos y síntomas.

Pto	Diagnóstico y severidad clínica	Marca
0	Ausente (movimientos sin inquietud = pseudoacatisia).	
1	Dudosa: tensión interna inespecífica, arrastre de pies.	
2	Acatisia leve: inquietud en piernas, mínimo malestar.	
3	Acatisia moderada: balanceo característico y estrés.	
4	Acatisia marcada: compulsión a andar; se sienta ≥ 5 min.	
5	Acatisia grave: deambulación constante, insomnio y estrés.	

INTERPRETACIÓN Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS (Barnes, 1989)

Criterio Diagnóstico de Acatisia:

- Se requiere la presencia combinada de síntomas subjetivos de inquietud (ítem 2 ≥ 1) y signos motores observables (ítem 1 ≥ 1).
- Si sólo hay movimientos sin vivencia interna se clasifica como **pseudoacatisia**.

Puntuación Global (Ítem 4):

- **0 - 1:** Sin acatisia / Dudosa.
 - **≥ 2 : Acatisia clínicamente significativa** (2=Leve, 3=Moderada, 4=Marcada, 5=Grave).
- Requiere ajuste de dosis antipsicótica o tratamiento coadyuvante (betabloqueantes).