

CUESTIONARIO DE SÍNTOMAS DE RETIRADA DE BENZODIACEPINAS (BWSQ)

Benzodiazepine Withdrawal Symptom Questionnaire — Autoinforme de 20 Ítems

Tyrer et al. (1990) • Instrumento específico para síndrome de abstinencia a BZD

Nombre / Código: _____

Fecha: _____

Edad: _____ años

Sexo: ☐ F ☐ M ☐ Otro

Evaluador: _____

INSTRUCCIONES:

Indique los síntomas experimentados desde el inicio de la reducción o retirada de tranquilizantes, señalando la intensidad (0=No, 1=Moderado, 2=Grave) y si ocurrieron al reducir o con la misma dosis:

0 = No | 1 = Sí, moderado | 2 = Sí, grave

Nº	Síntoma experimentado	0 No	1 Mod.	2 Grave	Al reducir dosis	Con dosis habitual
1	Sentimientos de irrealidad					
2	Muy sensible al ruido					
3	Muy sensible a la luz					
4	Muy sensible a los olores					
5	Muy sensible al tacto					
6	Sabor extraño en la boca					
7	Dolores musculares					
8	Contracciones musculares					
9	Sacudidas o temblores					
10	Hormigueos y pinchazos (en manos, brazos o piernas)					
11	Mareos					
12	Sentimientos de inestabilidad					
13	Sentirse enfermo/a					
14	Sentirse deprimido/a					
15	Molestias en los ojos					
16	Sensación de que las cosas se mueven cuando están quietas					
17	Ver o escuchar cosas que no existen (alucinaciones)					
18	Incapacidad de controlar sus movimientos					
19	Disminución de memoria					
20	Disminución de apetito					
21	Otro síntoma: _____					
22	Otro síntoma: _____					

PUNTUACIÓN E INTERPRETACIÓN CLÍNICA (Tyrer et al., 1990)**Regla de Puntuación:**

- Se suman las puntuaciones de intensidad de los 20 ítems (0, 1 o 2).
- **Rango Total:** de 0 a 40 puntos.
- Permite discriminar entre síndrome de retirada verdadero y ansiedad de rebote.

Puntos de Corte e Indicación Clínica:

- < 10 puntos: Síntomas de retirada leves o ausentes.
- 10 - 19 puntos: Retirada moderada; requiere supervisión y ajuste de pauta de deshabitación.
- ≥ 20 puntos: Síndrome de retirada benzodiacepínica grave.