

TEST DE FAGERSTRÖM DE DEPENDENCIA A LA NICOTINA

Fagerström Tolerance Questionnaire — Evaluación de la Adicción al Tabaco de 8 Ítems

Fagerström (1978); Heatherton et al. (1991) • Adaptación española: Becoña et al.

Nombre / Código: _____

Fecha: _____

Edad: _____ años

Sexo: ☐ F ☐ M ☐ Otro

Evaluador: _____

INSTRUCCIONES:

Responda a las siguientes preguntas indicando con una cruz (X) en la columna correspondiente su hábito respecto al consumo de cigarrillos:

Puntuación por ítem según las opciones de respuesta (0, 1 o 2 puntos)

Nº	Pregunta sobre Hábito Tabáquico	0 pts	1 pts	2 pts
1	¿Cuántos cigarrillos fuma al día? 0: < 15 1: 16 – 25 2: > 26			
2	Contenido de nicotina de sus cigarrillos: 0: Baja (< 0.5 mg) 1: Media (0.6 – 1.1 mg) 2: Alta (> 1.2 mg)			
3	¿Inhala el humo habitualmente? 0: Nunca 1: A veces 2: Siempre			
4	¿Fuma más por la mañana que por la tarde? 0: SÍ 1: NO			
5	Tiempo transcurrido desde que se levanta hasta el primer cigarrillo: 0: < 30 minutos (al despertar) 1: > 30 minutos (tras desayuno)			
6	¿Qué cigarrillo le costaría más suprimir? 0: El primero de la mañana 1: Cualquier otro			
7	¿Fuma cuando está enfermo y debe guardar cama la mayor parte del día? 0: SÍ 1: NO			
8	¿Fuma en lugares donde está prohibido (hospitales, cines, transportes)? 0: SÍ 1: NO			

PUNTUACIÓN TOTAL Y GRADO DE DEPENDENCIA NICOTÍNICA

Puntuación Total:

- Suma directa de los 8 ítems.
- **Rango Total: de 0 a 11 puntos.**
- El tiempo hasta el primer cigarrillo (ítem 5) y los cigarrillos/día (ítem 1) son los mejores predictores biológicos.

Puntos de Corte e Indicación Terapéutica:

- **0 - 4 puntos:** Dependencia nicotínica baja.
- **5 - 6 puntos:** Dependencia nicotínica moderada.
- **≥ 7 puntos:** **Dependencia nicotínica alta / muy alta** (candidato idóneo a terapia farmacológica sustitutiva o bupropión / vareniclina).