

ÍNDICE INTERNACIONAL DE FUNCIÓN ERÉCTIL (IIEF-15)

International Index of Erectile Function (Rosen et al., 1997) · Adaptación española validada

Paciente / Código:	Edad:	Fecha:
Evaluador / Centro:	Sexo: [] M Nº Historia Clínica:	Tratamiento actual:

INSTRUCCIONES: Indique cómo ha sido su funcionamiento erétil y sexual durante las últimas 4 semanas contestando a las 15 preguntas: **Escala: 0** = Sin intento/actividad | **1** = Casi nunca/nunca / Muy bajo / Muy difícil | **5** = Casi siempre/siempre / Muy alto / Muy fácil.

Nº	Dimensión de la Respuesta Sexual Masculina	0	1	2	3	4	5
1	¿Con qué frecuencia logró una erección durante la actividad sexual? (0 = Sin actividad, 1 = Casi nunca a 5 = Siempre).	()	()	()	()	()	()
2	Cuando tuvo erecciones con estimulación, ¿con qué frecuencia fueron suficientes para penetrar? (0 a 5).	()	()	()	()	()	()
3	Cuando intentó la penetración, ¿con qué frecuencia fue capaz de penetrar a su pareja? (0 a 5).	()	()	()	()	()	()
4	Durante el coito, ¿con qué frecuencia fue capaz de mantener la erección tras haber penetrado? (0 a 5).	()	()	()	()	()	()
5	Durante el coito, ¿cómo de difícil fue mantener la erección hasta finalizar el acto sexual? (0 a 5).	()	()	()	()	()	()
6	¿Cuántas veces intentó realizar el coito durante las últimas 4 semanas? (0 = Ninguna, 1 = 1-2 veces a 5 = >= 11 veces).	()	()	()	()	()	()
7	Cuando intentó el coito, ¿con qué frecuencia fue satisfactorio para usted? (0 a 5).	()	()	()	()	()	()
8	¿En qué medida disfrutó con la relación sexual / coito? (0 = Sin relación, 1 = Ninguno a 5 = Muchísimo).	()	()	()	()	()	()
9	Cuando tuvo estimulación sexual o coito, ¿con qué frecuencia eyaculó? (0 a 5).	()	()	()	()	()	()
10	Cuando tuvo estimulación o coito, ¿con qué frecuencia tuvo la sensación de orgasmo (con o sin eyaculación)? (0 a 5).	()	()	()	()	()	()
11	¿Con qué frecuencia sintió deseo sexual a lo largo de las últimas 4 semanas? (1 = Casi nunca/nunca a 5 = Casi siempre).	()	()	()	()	()	()
12	¿Cómo calificaría su nivel de deseo sexual en las últimas 4 semanas? (1 = Muy bajo/nulo a 5 = Muy alto).	()	()	()	()	()	()
13	¿Cómo de satisfecho ha estado con su vida sexual en general? (1 = Muy insatisfecho a 5 = Muy satisfecho).	()	()	()	()	()	()
14	¿Cómo de satisfecho ha estado con su relación sexual de pareja? (1 = Muy insatisfecho a 5 = Muy satisfecho).	()	()	()	()	()	()
15	¿Cómo calificaría su confianza en poder lograr y mantener una erección? (1 = Muy baja a 5 = Muy alta).	()	()	()	()	()	()

NORMAS DE CORRECCIÓN, CRITERIOS DE PUNTUACIÓN Y BAREMOS CLÍNICOS (IIEF)

Cómputo por Dominios Clínicos (Rosen et al., 1997):

1. Función Erétil (Ítems 1, 2, 3, 4, 5 y 15)	_____
	/ 30
2. Función Orgásmica (Ítems 9 y 10)	_____
	/ 10
3. Deseo Sexual (Ítems 11 y 12)	_____
	/ 10
4. Satisfacción con el Coito (Ítems 6, 7 y 8)	_____
	/ 15
5. Satisfacción Global (Ítems 13 y 14)	_____
	/ 10

Criterios de Puntuación y Severidad de la Disfunción Erétil (DE):

Puntos Dominio Erétil	Estratificación Clínica
26 - 30 puntos	Función erétil normal
22 - 25 puntos	Disfunción erétil leve
17 - 21 puntos	Disfunción erétil leve-moderada
11 - 16 puntos	Disfunción erétil moderada
1 - 10 puntos	Disfunción erétil grave