

CRITERIOS DEL HOSPITAL DEL MAR PARA EVALUACIÓN DE LAXITUD ARTICULAR

Evaluación Clínica de Hiperlaxitud y Correlación con Trastornos de Ansiedad y Pánico

Antoni Bulbena et al. (1992) • IMIM Barcelona

Nombre / Código: _____ Fecha: _____

Edad: _____ años Sexo: ☐ F ☐ M ☐ Otro Evaluador: _____

INSTRUCCIONES:

Examen físico por observador. Valore cada maniobra bilateral de forma independiente (Derecha / Izquierda) y la equimosis anamnésica:

D (+) = Positivo lado derecho | **D (-)** = Negativo derecho | **I (+)** = Positivo izquierdo | **I (-)** = Negativo izquierdo

Nº	Maniobra de Exploración Articular	D (+)	D (-)	I (+)	I (-)
1	Pulgar: Aposición pasiva del pulgar a la cara flexora del antebrazo a una distancia < 21 mm.				
2	Metacarpofalángica: Con la palma apoyada sobre la mesa, la dorsiflexión pasiva del 5º dedo es >= 90°.				
3	Hiperextensión del codo: La hiperextensión pasiva del codo es >= 10°.				
4	Rotación externa del hombro: Con el codo a 90° junto al tórax, el antebrazo rota externamente > 85°.				
5	Abducción de cadera: En decúbito supino, la abducción pasiva de la cadera alcanza un ángulo >= 85°.				
6	Hipermovilidad rotuliana: Sujetando la tibia proximal, la rótula se desplaza lateralmente con gran facilidad.				
7	Hipermovilidad de tobillo y pie: Rango excesivo de dorsoflexión pasiva del tobillo y eversión marcada del pie.				
8	Metatarsofalángica: Flexión dorsal del dedo gordo del pie sobre el primer metatarsiano >= 90°.				
9	Hiperflexión de la rodilla: En decúbito prono, la flexión de la rodilla permite al talón tocar la nalga.				
10	Equimosis fácil: Aparición habitual de hematomas o equimosis tras traumatismos mínimos o inadvertidos.				

DIAGNÓSTICO DE HIPERLAXITUD Y RELEVANCIA PSIQUIÁTRICA

Puntos de Corte (Bulbena et al., 1992):

- Se considera positivo un criterio si se cumple en al menos un lado.
- **Mujeres:** ≥ 5 criterios positivos de 10.
- **Hombres:** ≥ 4 criterios positivos de 10.

Síndrome Neuroconectivo:

- La hiperlaxitud es un marcador de vulnerabilidad fenotípica para el Trastorno de Pánico y Agorafobia (OR > 10).
- Asocia mayor reactividad autonómica, disautonomía y prolapso mitral.