

TEST DE OTHMER Y DESOUZA PARA DETECCIÓN DE SOMATIZACIÓN

Cribado Clínico Rápido para el Trastorno de Somatización / Síndrome de Briquet

Ekkehard Othmer y Celso R. DeSouza (1985)

Nombre / Código: _____

Fecha: _____

Edad: _____ años

Sexo: ☐ F ☐ M ☐ Otro

Evaluador: _____

INSTRUCCIONES:

Heteroaplicada o autoinforme de cribado. Pregunte al paciente si ha presentado los siguientes síntomas a lo largo de su vida sin causa orgánica demostrada:

SÍ = Síntoma experimentado de forma repetida (1 punto) | **NO** = Síntoma nunca presentado (0 puntos)

Nº	Síntoma Somatomorfo Evaluado	SÍ	NO
1	¿Ha tenido alguna vez dificultad para tragar o sensación de nudo en la garganta (globo hístico)?		
2	¿Ha tenido alguna vez sensación de quemazón en los órganos sexuales o en el recto?		
3	¿Ha tenido alguna vez dificultad para recordar lo que había hecho horas o días antes (amnesia disociativa, descartando consumo de sustancias o alcohol)?		
4	¿Ha tenido alguna vez dificultades para respirar o sensación de ahogo de origen no orgánico?		
5	¿Ha padecido alguna vez vómitos frecuentes o inexplicables médicamente?		
6	¿Ha sufrido de forma repetida dolores menstruales intensos e invalidantes sin causa ginecológica clara?		
7	¿Ha padecido alguna vez dolores frecuentes e inexplicables en los dedos de las manos o de los pies?		

PUNTUACIÓN, VALIDEZ Y CRITERIOS CLÍNICOS (Othmer & DeSouza, 1985)

Puntuación y Punto de Corte:

- Cada respuesta afirmativa (**SÍ**) suma 1 punto. Rango total: **0 a 7 puntos**.

- **≥ 4 puntos**: Cribado **POSITIVO** para Trastorno de Somatización (Sensibilidad 95%, Especificidad 90% para criterios DSM-III).

Relevancia en Atención Médica:

- **≥ 3 puntos**: Justifica evaluación psiquiátrica exhaustiva y revisión somática para evitar hiperfrecuentación y exploraciones cruentas.

- **0 - 2 puntos**: Cribado negativo, baja probabilidad de somatización grave.