

STOP-Bang — Cuestionario de Apnea Obstructiva del Sueño

Screening de Riesgo de SAHOS · F. Chung et al. (2008, 2012) · University Health Network Toronto · 8 ítems

EJE VI · NEUMONOLOGÍA / SUEÑO

Nombre:

Edad:

Fecha:

IMC (kg/m²):

Instrucciones: Responda a cada una de las 8 preguntas marcando **SÍ** (1 punto) o **NO** (0 puntos):

Ítem	Criterio STOP-Bang	Sí (1)	NO (0)
S	Snoring (Ronquido): ¿Ronca usted fuerte? (¿tan fuerte que se escucha a través de puertas cerradas o su pareja le da codazos para que no ronque?)	☐	☐
T	Tired (Cansancio): ¿Se siente con frecuencia cansado/a, fatigado/a o con somnolencia durante el día? (por ejemplo, ¿se queda dormido al conducir?)	☐	☐
O	Observed (Apneas observadas): ¿Alguien ha observado que usted deja de respirar, se ahoga o le falta el aire mientras duerme?	☐	☐
P	Pressure (Presión arterial): ¿Tiene o está recibiendo tratamiento médico para la hipertensión arterial?	☐	☐
B	BMI (Índice de masa corporal): ¿Su IMC es mayor a 35 kg/m²? (Peso en kg / Altura en m²)	☐	☐
A	Age (Edad): ¿Tiene más de 50 años?	☐	☐
N	Neck circumference (Circunferencia del cuello): ¿El contorno de su cuello mide más de 43 cm (hombres) o más de 41 cm (mujeres)?	☐	☐
G	Gender (Género): ¿Es usted de sexo biológico masculino?	☐	☐

Estratificación del Riesgo de SAHOS (STOP-Bang):

PUNTUACIÓN TOTAL: ____ / 8

Cada respuesta afirmativa (Sí) suma 1 punto. Rango de 0 a 8 puntos.

Puntuación	Nivel de Riesgo	Conducta Clínica Recomendada
0 a 2 puntos	Bajo Riesgo de SAHOS	Baja probabilidad de apnea obstructiva moderada o grave.
3 a 4 puntos	Riesgo Intermedio	Vigilancia clínica; considerar polisomnografía si hay comorbilidad cardiovascular.
5 a 8 puntos	Alto Riesgo de SAHOS	Alta probabilidad de SAHOS moderado-severo; derivación prioritaria a medicina del sueño / polisomnografía.