

ESCALA DE EFECTOS SECUNDARIOS (UKU)

Udvalg für Kliniske Undersogelser — Evaluación Integral de Reacciones Adversas
Lingjaerde et al. (1987) • Escala clínica estándar europea de farmacovigilancia

Nombre / Código: _____

Fecha: _____

Edad: _____ años

Sexo: ☐ F ☐ M ☐ Otro

Evaluador: _____

INSTRUCCIONES:
Evalúe la gravedad de cada síntoma observado o referido (0=Ausente, 1=Leve, 2=Moderado, 3=Grave) y estime la probabilidad de relación causal con el fármaco psicotropo:
Gravedad: 0 = No | 1 = Leve | 2 = Moderado | 3 = Grave | **Causalidad:** Improbable | Posible | Probable

Nº	Efecto secundario (UKU)	0 No	1 Leve	2 Mod	3 Gra	Improb	Posible	Probab
1.	EFECTOS PSÍQUICOS							
1.1	Dificultad de concentración							
1.2	Astenia / lasitud / fatigabilidad							
1.3	Somnolencia / sedación diurna							
1.4	Alteraciones mnésicas (memoria)							
1.5	Depresión / empeoramiento afectivo							
1.6	Tensión psíquica / inquietud interna							
1.7	Aumento de la duración del sueño							
1.8	Disminución de la duración del sueño							
1.9	Aumento de los sueños / pesadillas							
1.10	Indiferencia emocional / apatía							
2.	EFECTOS NEUROLÓGICOS							
2.1	Distonía aguda o tardía							
2.2	Rigidez muscular							
2.3	Hipocinesia / acinesia							
2.4	Hipercinesia / movimientos anormales							
2.5	Temblor (reposo, postural, acción)							
2.6	Acatisia motora							
2.7	Crisis epilépticas / convulsiones							
2.8	Parestesias / alteraciones sensitivas							

Nº	Efecto secundario (UKU)	0 No	1 Leve	2 Mod	3 Gra	Improb	Posible	Probab
3.	EFFECTOS AUTONÓMICOS							
3.1	Trastornos de acomodación visual							
3.2	Aumento de salivación (sialorrea)							
3.3	Disminución de salivación (sequedad bucal)							
3.4	Náuseas / vómitos							
3.5	Diarrea							
3.6	Estreñimiento							
3.7	Alteraciones de la micción / retención							
3.8	Poliuria / polidipsia							
3.9	Vértigo ortostático / hipotensión							
3.10	Palpitaciones / taquicardia							
3.11	Aumento de sudoración (diaforesis)							
4.	OTROS EFECTOS SECUNDARIOS							
4.1	Exantema morbiliforme o máculo-papular							
4.2	Exantema petequial / purpúrico							
4.3	Exantema urticarial							
4.4	Exantema sorioso o eccematoso							
4.5	Prurito							
4.6	Fotosensibilidad cutánea							
4.7	Aumento de la pigmentación cutánea							
4.8	Aumento de peso							
4.9	Pérdida de peso							
4.10	Menorragia / metrorragia							
4.11	Amenorrea							
4.12	Galactorrea							
4.13	Ginecomastia							
4.14	Alteración del deseo sexual (hipo/hiper)							
4.15	Disfunción eréctil							
4.16	Disfunción eyaculatoria							
4.17	Disfunción orgásmica							
4.18	Cefalea (tensional / migrañosa)							

EVALUACIÓN E INTERPRETACIÓN CLÍNICA (Lingjaerde et al., 1987)**Gradación de Severidad:**

- **0 (Ausente):** No presente o normal.
- **1 (Leve):** No interfiere con el funcionamiento del paciente.
- **2 (Moderado):** Interfiere moderadamente con el funcionamiento.
- **3 (Grave):** Interfiere gravemente e incapacita al paciente.

Conducta Terapéutica ante Efectos Adversos:

- Grado 1: Monitorización expectante sin cambio de dosis.
- Grado 2: Valorar ajuste o reducción de dosis / coadyuvante.
- Grado 3: Considerar suspensión o cambio del psicofármaco.