

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Cuestionario de Experiencias Adversas en la Infancia (ACEQ)

Eje III • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1 Identificación

Nombre	Cuestionario de Experiencias Adversas en la Infancia
Sigla	ACEQ
Autores	Felitti, V. J., et al. (CDC y Kaiser Permanente)
Año	1998
Eje	EJE I – PROBLEMAS, SÍNTOMAS Y RIESGO
Constructo principal	Trauma acumulado y Adversidad temprana
Población	Adultos (retrospectivo)
Tipo de instrumento	Cuestionario de autoinforme
Disponibilidad en español	Sí (OMS/CDC)
Acceso/licencia	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Nota curatorial de derechos	Material CDC; revisar aviso de copyright y condiciones de reutilización.

2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Trauma acumulado y Adversidad temprana. La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

Dominio conceptual	No verificado en las fuentes disponibles.
Dimensiones declaradas	10 categorías de adversidad agrupadas en 3 dominios (Abuso [físico, emocional, sexual], Negligencia [física, emocional], y Disfunción del Hogar [violencia doméstica, abuso de sustancias, enfermedad mental, separación/divorcio, miembro encarcelado]).

3 Características generales

Formato	Cuestionario de autoinforme
Población objetivo	Adultos (retrospectivo)
Número de ítems	11 ítems (módulo BRFSS-ACE del CDC; ver nota de versión). CORREGIDO 2026-08-10 tras cotejo directo: el Protocolo.pdf de este acervo es el módulo oficial CDC BRFSS-ACE de 11 preguntas (8 categorías), NO la versión clásica de 10 categorías de Felitti et al. (1998) que describía esta ficha originalmente. Son instrumentos del mismo linaje pero con formato de respuesta distinto: preguntas 1-5 dicotómicas (Sí/No), preguntas 6-11 con escala de frecuencia (1=Nunca, 2=Una vez, 3=Más de una vez). El protocolo está en inglés; no se localizó traducción oficial CDC al español de este módulo específico.
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Formato de respuesta	Mixto: preguntas 1-5 dicotómicas (Sí/No); preguntas 6-11 con escala de frecuencia de 3 puntos (Nunca/Una vez/Más de una vez), más opciones de No sabe/Rehúsa.
Administración	No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial.

Tiempo estimado	No verificado en las fuentes disponibles.
------------------------	---

4 Estructura

Dimensiones/subescalas	10 categorías de adversidad agrupadas en 3 dominios (Abuso [físico, emocional, sexual], Negligencia [física, emocional], y Disfunción del Hogar [violencia doméstica, abuso de sustancias, enfermedad mental, separación/divorcio, miembro encarcelado]).
Ítems	11 ítems del módulo CDC BRFSS-ACE (no 10). CORREGIDO 2026-08-10 tras cotejo directo: el Protocolo.pdf de este acervo es el módulo oficial CDC BRFSS-ACE de 11 preguntas (8 categorías), NO la versión clásica de 10 categorías de Felitti et al. (1998) que describía esta ficha originalmente. Son instrumentos del mismo linaje pero con formato de respuesta distinto: preguntas 1-5 dicotómicas (Sí/No), preguntas 6-11 con escala de frecuencia (1=Nunca, 2=Una vez, 3=Más de una vez). El protocolo está en inglés; no se localizó traducción oficial CDC al español de este módulo específico.
Control curatorial de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Respuesta	Mixto (dicotómico para preguntas 1-5; escala de frecuencia de 3 puntos para preguntas 6-11) — no es puramente dicotómico como en la versión clásica de 10 ítems.
Relación ítem-dimensión	No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.

5 Sistema de puntuación

Sumatoria simple de respuestas afirmativas (rango 0 a 10).

Regla de corrección	No verificado para este módulo específico de 11 preguntas — el punto de corte ≥ 4 y el rango 0-10 citados abajo corresponden a la versión CLÁSICA de 10 categorías (Felitti et al., 1998), NO al módulo BRFSS-ACE de 11 preguntas del Protocolo.pdf de este acervo. No aplicar ese corte sin adaptarlo primero al formato mixto de respuesta de este protocolo.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.
Baremos	No verificado en una fuente normativa autorizada.
Control de versión	No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población.

6 Interpretación

Dimensional/Riesgo Acumulado. Puntuaciones ≥ 4 indican un riesgo exponencialmente mayor de psicopatología severa, adicciones y enfermedades crónicas.

Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.

7 Evidencia psicométrica

Mide abuso emocional/físico/sexual, y disfunción del hogar. Es la medida epidemiológica más usada para trauma acumulado.

Consistencia interna	No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.
Validez	Mide abuso emocional/físico/sexual, y disfunción del hogar. Es la medida epidemiológica más usada para trauma acumulado.
Fiabilidad temporal	No verificado en las fuentes disponibles.
Muestra y contexto	No verificado de forma suficiente para generalización.

8 Adaptaciones

Español	Existen versiones oficiales y adaptaciones en español.
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Versión exacta	Ledger curado disponible con 3 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.
Población/país	Adultos (retrospectivo)
Alerta de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Advertencia	Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia.

9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Trauma acumulado y Adversidad temprana en Adultos (retrospectivo), condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Felitti, V. J., et al. (CDC y Kaiser Permanente); 1998.
- Disponibilidad española reportada: Sí (OMS/CDC)
- Trazabilidad local: 0 archivo(s) técnicamente legible(s) y 0 PDF web verificado(s).

11 Limitaciones

- Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
- Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 0.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

13 Síntesis técnica

Constructo	Trauma acumulado y Adversidad temprana
Población	Adultos (retrospectivo)
Estructura	Catálogo: 10 ítems (uno por cada categoría).; 10 categorías de adversidad agrupadas en 3 dominios (Abuso [físico, emocional, sexual], Negligencia [física, emocional], y Disfunción del Hogar [violencia doméstica, abuso de sustancias, enfermedad mental, separación/divorcio, miembro encarcelado]). Control curado: No fijado en el ledger estructurado.
Puntuación	Sumatoria simple de respuestas afirmativas (rango 0 a 10).
Interpretación	Dimensional/Riesgo Acumulado. Puntuaciones ≥ 4 indican un riesgo exponencialmente mayor de psicopatología severa, adicciones y enfermedades crónicas.
Estado de fuentes	Locales válidos: 0; web PDF: 0; aislados: 0.
Estado de uso	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Decisión técnica	Ficha documental disponible. La aptitud clínica requiere protocolo autorizado, versión fijada y verificación por profesional competente.

14 Referencias APA 7

Felitti, V. J., et al. (CDC y Kaiser Permanente) (1998). Cuestionario de Experiencias Adversas en la Infancia.

<https://www.cdc.gov/aces/about/index.html>

[https://doi.org/10.1016/S0749-3797\(98](https://doi.org/10.1016/S0749-3797(98)

<https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/aces-questionnaire.pdf>

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.

Verificación técnica y trazabilidad — revisión 2026-08-10

Esta sección prevalece sobre datos anteriores cuando existe conflicto. Se cotejó el activo local y se usaron únicamente fuentes identificables. 'No verificado' significa que no se encontró evidencia suficiente; no es una inferencia ni una reconstrucción.

1. Versión exacta y activo cotejado	Módulo CDC BRFSS-ACE, 11 preguntas/8 categorías; activo recompuesto con texto inglés y prólogo traducido orientativamente. Activo cotejado: Protocolo.pdf, SHA-256 1cc5e3e2eb3e2 793 444 705d4f40b3c7cf2fcd890 187db148 579 754 101 c4bcfb1.
2. Población e informante	Ficha previa: Adultos (retrospectivo). Confirmar límites etarios, contexto e informante en el manual de la versión exacta.
3. Administración	Entrevista/autoinforme asistido; el propio formulario admite omitir preguntas sensibles.
4. Tiempo de aplicación	NO VERIFICADO: el formulario no informa una duración y no se localizó una fuente primaria específica de esta forma.
5. Estructura e ítems reales	Módulo CDC BRFSS-ACE, 11 preguntas/8 categorías; activo recompuesto con texto inglés y prólogo traducido orientativamente.
6. Periodo temporal	Antes de los 18 años (retrospectivo).
7. Escala/formato de respuesta	P1–5: Sí/No; P6–11: Nunca/Una vez/Más de una vez, más NS/rehúsa.
8. Algoritmo de puntuación	NO VERIFICADO PARA USO OPERATIVO. Descripción previa: No verificado. Confirmar con manual/clave de la forma exacta antes de aplicar.
9. Manejo de omisiones	NO VERIFICADO: no se encontró una regla explícita y legítima para datos faltantes de la versión exacta. No imputar ni prorratear sin manual.
10. Psicometría específica español/LatAm	NO VERIFICADO de forma específica para esta versión, idioma y población española/latinoamericana. La mera existencia de estudios o de una traducción no acredita equivalencia.
11. Baremos, cortes e interpretación	Dimensional/Riesgo Acumulado. Puntuaciones ≥ 4 indican un riesgo exponencialmente mayor de psicopatología severa, adicciones y enfermedades crónicas. Usar solo si coincide con la versión/población citada; no se asume universalidad.
12. Licencia, uso y redistribución	Estado conservador: Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir. No redistribuir/modificar hasta documentar titular y permiso de la versión exacta.
13. Referencias y fuentes verificadas	CDC, BRFSS ACE Module (11 preguntas, texto oficial en inglés), https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/brfss_adverse_module.pdf . Felitti et al. (1998), doi:10.1016/S0749-3797(98)00017-8.
14. Decisión de QA	PARCIAL: identidad del módulo ya corregida, pero el activo es inglés con prólogo orientativo en español; no es un protocolo español validado.