

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Inventario de Depresión de Beck - II (BDI-II)

Eje I • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1 Identificación

Nombre	Inventario de Depresión de Beck - II
Sigla	BDI-II
Autores	Beck, A. T., Steer, R. A., & Brown, G. K.
Año	1996
Eje	EJE I – PROBLEMAS, SÍNTOMAS Y RIESGO
Constructo principal	Depresión y anhedonia
Población	Adolescentes (>13 años) y adultos
Tipo de instrumento	Cuestionario de autoinforme
Disponibilidad en español	Sí (Sanz et al., 2003 para España; múltiples en Latinoamérica)
Acceso/licencia	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Nota curatorial de derechos	No descargar formularios copiados.

2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Depresión y anhedonia. La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

Dominio conceptual	Problemas, Síntomas y Riesgo (General)
Dimensiones declaradas	2 dimensiones principales (Cognitivo-Afectiva y Somático-Vegetativa).

3 Características generales

Formato	Cuestionario de autoinforme
Población objetivo	Adolescentes (>13 años) y adultos
Número de ítems	21 ítems.
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Formato de respuesta	Escala Likert de 4 puntos (0 a 3, con frases descriptivas específicas por ítem).
Administración	No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial.
Tiempo estimado	No verificado en las fuentes disponibles.

4 Estructura

Dimensiones/subescalas	2 dimensiones principales (Cognitivo-Afectiva y Somático-Vegetativa).
Ítems	21 ítems.
Control curatorial de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Respuesta	Escala Likert de 4 puntos (0 a 3, con frases descriptivas específicas por ítem).
Relación ítem-dimensión	No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.

5 Sistema de puntuación

Sumatoria simple (0 a 63 puntos).

Regla de corrección	Sumatoria simple (0 a 63 puntos).
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.
Baremos	No verificado en una fuente normativa autorizada.
Control de versión	No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población.

6 Interpretación

Puntos de corte: 0-13 (Mínima), 14-19 (Leve), 20-28 (Moderada), 29-63 (Severa).

Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.

7 Evidencia psicométrica

Instrumento globalmente más utilizado para medir gravedad de la depresión. Excelente consistencia interna (alfa > .90).

Consistencia interna	No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.
Validez	Instrumento globalmente más utilizado para medir gravedad de la depresión. Excelente consistencia interna (alfa > .90).
Fiabilidad temporal	No verificado en las fuentes disponibles.
Muestra y contexto	No verificado de forma suficiente para generalización.

8 Adaptaciones

Español	Sí (Sanz et al., 2003 para España; múltiples en Latinoamérica)
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Versión exacta	Ledger curado disponible con 2 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.
Población/país	Adolescentes (>13 años) y adultos
Alerta de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Advertencia	Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia.

9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Depresión y anhedonia en Adolescentes (>13 años) y adultos, condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Beck, A. T., Steer, R. A., & Brown, G. K.; 1996.
- Disponibilidad española reportada: Sí (Sanz et al., 2003 para España; múltiples en Latinoamérica)
- Trazabilidad local: 2 archivo(s) técnicamente legible(s) y 0 PDF web verificado(s).

11 Limitaciones

- Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
- Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 0.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

13 Síntesis técnica

Constructo	Depresión y anhedonia
Población	Adolescentes (>13 años) y adultos
Estructura	Catálogo: 21 ítems.; 2 dimensiones principales (Cognitivo-Afectiva y Somático-Vegetativa).. Control curado: No fijado en el ledger estructurado.
Puntuación	Sumatoria simple (0 a 63 puntos).
Interpretación	Puntos de corte: 0-13 (Mínima), 14-19 (Leve), 20-28 (Moderada), 29-63 (Severa).
Estado de fuentes	Locales válidos: 2; web PDF: 0; aislados: 0.
Estado de uso	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Decisión técnica	Ficha documental disponible. La aptitud clínica requiere protocolo autorizado, versión fijada y verificación por profesional competente.

14 Referencias APA 7

Beck, A. T., Steer, R. A., & Brown, G. K. (1996). Inventario de Depresión de Beck - II.

Fuente de referencia del catálogo: Comercializado por Pearson.

<https://www.pearsonclinical.es/es-es/Store/Professional-Assessments/Personality-%26-Biopsychosocial/Psychopathology//p/P100200026?productId=9788493931544>

<https://www.pearsonclinical.es/mwdownloads/download/link/id/888>

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.

Verificación técnica y trazabilidad — revisión 2026-08-10

Esta sección prevalece sobre datos anteriores cuando existe conflicto. Se cotejó el activo local y se usaron únicamente fuentes identificables. 'No verificado' significa que no se encontró evidencia suficiente; no es una inferencia ni una reconstrucción.

1. Versión exacta y activo cotejado	BDI-II español, 21 grupos de afirmaciones. Activo cotejado: Protocolo.pdf, SHA-256 8f65 872 462fd0e485be79ffe240eaa5f6c969dac102cd12b5ff9d65b158a105.
2. Población e informante	Ficha previa: Adolescentes (>13 años) y adultos. Confirmar límites etarios, contexto e informante en el manual de la versión exacta.
3. Administración	Autoinforme.
4. Tiempo de aplicación	NO VERIFICADO: el formulario no informa una duración y no se localizó una fuente primaria específica de esta forma.
5. Estructura e ítems reales	BDI-II español, 21 grupos de afirmaciones.
6. Periodo temporal	Últimas dos semanas, incluido hoy.
7. Escala/formato de respuesta	0–3 por grupo.
8. Algoritmo de puntuación	Sumar una puntuación 0–3 por cada uno de los 21 grupos; rango 0–63. En grupos con opciones múltiples se conserva el valor de severidad seleccionado conforme al formulario/manual.
9. Manejo de omisiones	NO VERIFICADO: no se encontró una regla explícita y legítima para datos faltantes de la versión exacta. No imputar ni prorratear sin manual.
10. Psicometría específica español/LatAm	Muestra clínica española N=305; consistencia interna alfa=.89 en el estudio citado. No se adoptan cortes sin el manual de la edición utilizada.
11. Baremos, cortes e interpretación	Puntos de corte: 0-13 (Mínima), 14-19 (Leve), 20-28 (Moderada), 29-63 (Severa). Usar solo si coincide con la versión/población citada; no se asume universalidad.
12. Licencia, uso y redistribución	COMERCIAL/RESTRINGIDO: Pearson. El artículo de validación no autoriza reproducir el protocolo.
13. Referencias y fuentes verificadas	Sanz et al., adaptación española. Evidencia clínica española: https://journals.copmadrid.org/clysa/art/37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c . Material de aplicación: Pearson.
14. Decisión de QA	PARCIALMENTE COTEJADO: estructura visible contrastada con Protocolo.pdf. Los campos marcados NO VERIFICADO siguen bloqueando una declaración de completitud clínica.