

BPRS — Escala Breve de Evaluación Psiquiátrica (Brief Psychiatric Rating Scale, BPRS)

Administración: Heteroaplicada

N.º de ítems: 18

Descripción, corrección e interpretación (texto íntegro de la fuente):

La BPRS fue desarrollada para realizar evaluaciones rápidas y altamente eficientes de los cambios producidos en los síntomas de los pacientes mentales. En la actualidad se utiliza preferentemente como una medida de gravedad e incluso de subtipificación (positivo o negativo) del trastorno esquizofrénico. La versión más utilizada en la actualidad consta de 18 ítems (la versión original tenía 16), aunque existe una versión ampliada con 24 ítems. Cada ítem se puntúa según una escala Likert de 7 grados de intensidad o gravedad. En esta escala el 1 siempre equivale a ausencia del síntoma y el 7 a presencia con una gravedad extrema. En la versión de 18 ítems se utiliza una escala Likert de 5 valores que oscila entre 0 (ausencia del síntoma) y 4 (muy grave). Para cada ítem existe una definición y criterios operativos de bases para la evaluación y de puntuación (están descritos detalladamente en la primera referencia de las indicadas en el epígrafe de referencias complementarias). El marco de referencia temporal no está claramente delimitado y normalmente se utiliza los días previos a la entrevista. Ha de ser administrada por un clínico, utilizando la técnica de entrevista semiestructurada.

CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN

La versión de 18 ítems proporciona una puntuación global y puntuaciones en dos apartados: síntomas negativos y síntomas positivos. La puntuación total se obtiene sumando las puntuaciones en cada uno de los 18 ítems, por lo que puede oscilar entre 0 y 72. La puntuación en el cluster de síntomas negativos se obtiene sumando las puntuaciones en los ítems 3 (retraimiento emocional), 13 (enlentecimiento motor), 16 (aplanamiento afectivo) y 18 (desorientación). Esta puntuación oscila entre 0 y 16.

La puntuación en el cluster de síntomas positivos se obtiene sumando las puntuaciones en los ítems 4

(desorganización conceptual), 11 (susplicia), 12 (alucinaciones) y 15 (contenidos del pensamiento inusua-

les). Su puntuación también oscila entre 0 y 16.

Para la versión de 18 ítems puntuados con una escala Likert de 5 valores, de 0 a 4, se recomiendan los siguientes

puntos de corte:

0-9: ausencia del trastorno.

10-20: trastorno leve o «caso probable».

21: trastorno grave o «caso cierto».

Fuente: The Brief Psychiatric Rating Scale. Psychological Reports 1962; 10: 799-812