

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Borderline Symptom List-23 (BSL-23)

Eje I • Versión de trabajo: 10 de septiembre de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

Familia / sigla	BSL-23
Nombre completo	Borderline Symptom List-23 — Lista de Síntomas Límite-23
Versión / edición	Versión abreviada de 23 ítems (derivada de la versión extensa de 95 ítems), más un ítem adicional de escala analógica visual (ítem 24) para malestar global.
Idioma	Español (adaptación de Soler, Vega et al., 2013).
Autores (original)	Bohus, M., Schmahl, C., et al. (2009). Adaptación española: Soler, J., Vega, D., et al. (2013).
Año (original / adaptación)	2009 (original); 2013 (adaptación y validación española).
Eje primario	Eje I — Problemas, síntomas y riesgo
Etiquetas	Trastorno límite de la personalidad; TLP; desregulación emocional; disociación; conductas autodestructivas.
Pregunta clínica que responde	¿Cuál es la intensidad actual de los síntomas centrales y el malestar subjetivo asociados al Trastorno Límite de la Personalidad, y cómo evoluciona con el tratamiento?
Población	Adolescentes y adultos con sospecha o diagnóstico de TLP.
Contexto de aplicación	Psicología clínica, psiquiatría (monitoreo del TLP), investigación en psicoterapia y salud mental.
Informante	Autoinforme.
Modalidad de administración	Papel y lápiz; aproximadamente 5 minutos.
Número de ítems	23 ítems centrales + 1 ítem de escala analógica visual (ítem 24) para malestar global (verificado en la ficha técnica fuente).
Periodo temporal de referencia	No verificado en las fuentes consultadas (habitualmente la última semana en las versiones publicadas del BSL, no confirmado en esta sesión).
Formato de respuesta	Escala Likert de 5 puntos: 0 = Para nada, 1 = Un poco, 2 = Moderadamente, 3 = Mucho, 4 = Extremadamente.
Tiempo estimado de aplicación	Aproximadamente 5 minutos (declarado en la ficha técnica fuente).

Regla de puntuación	Media aritmética de los 23 ítems (suma total dividida por 23), rango 0-4. Sin ítems invertidos, según la ficha técnica fuente.
Ítems invertidos	Ninguno, según la ficha técnica fuente.
Ítems omitidos / reglas de omisión	No verificado en las fuentes consultadas.
Rango posible	0-4 (media aritmética).
Puntos de corte	La ficha técnica fuente indica que puntuaciones medias superiores a 1.5 sugieren sintomatología límite severa y malestar subjetivo elevado; no se verificó de forma independiente contra el artículo de validación española de 2013 en esta sesión.
Activos disponibles	Protocolo.pdf (formulario de 23 ítems + escala analógica, copiado desde Downloads/Instrumentos/Eje I/BSL_23/BSL23_Scale.pdf de la raíz del proyecto). Ficha_Tecnica.docx / .pdf.
Hash / verificación	Ver MANIFIESTO_SHA256.csv del proyecto.
Estado QA	Familia nueva, incorporada 2026-09-10 desde carpeta suelta de la raíz. Ficha construida a partir de BSL23_Ficha.pdf (carpeta suelta) y verificación directa del formulario administrable. No se verificó independientemente el artículo de validación española (Soler et al., 2013) contra fuente primaria en esta sesión. Requiere revisión humana antes de uso clínico, dado el contenido sensible sobre ideación autolítica y autolesiones.
Fecha	2026-09-10
Responsable	Claude — proceso automatizado, requiere revisión humana
Versión de la ficha	1.0

3. Constructo, finalidad y usos

Constructo evaluado: síntomas centrales y malestar subjetivo del Trastorno Límite de la Personalidad — afecto negativo, inestabilidad de la autoimagen, conductas autodestructivas, impulsividad y disociación.

Finalidad: evaluar de forma rápida y sensible la sintomatología límite, útil para monitorizar la respuesta al tratamiento (p. ej. Terapia Dialéctico-Conductual).

Usos apropiados

Monitoreo evolutivo de síntomas límite a lo largo del tratamiento psicoterapéutico.

Cribado sensible en población con sospecha de TLP, como parte de una evaluación multimétodo.

Usos NO apropiados

Diagnóstico diferencial primario del TLP: la propia ficha técnica fuente indica que no se recomienda como único criterio diagnóstico.

Ignorar reactivos sobre ideación autolítica o autolesiones sin seguimiento clínico, independientemente del puntaje total.

9. Adaptación cultural y norma local

Validación española de Soler et al. (2013), que según la ficha técnica fuente ratificó excelente consistencia interna, fiabilidad test-retest y adecuada validez convergente con otras medidas de desregulación emocional. No verificado de forma independiente contra el artículo original en esta sesión.

10. Límites clínicos, seguridad, derivación y no-diagnóstico

Alta presencia de reactivos sobre ideación autolítica y autolesiones: los resultados deben evaluarse con sensibilidad clínica y disponibilidad de seguimiento inmediato si es necesario.

No sustituye una evaluación clínica estructurada del TLP ni el juicio profesional.

11. Titular, licencia y condiciones de reproducción

Publicado en *Psychopathology* (Bohus et al., 2009) y *Actas Españolas de Psiquiatría* (Soler et al., 2013); no se verificó de forma independiente en esta sesión la licencia exacta de reproducción del instrumento completo — no verificado, revisar antes de distribución masiva o uso comercial.

12. DOI / URL oficiales y referencias APA

Bohus, M., et al. (2009). Borderline Symptom List (BSL-23): development and psychometric properties. *Psychopathology*, 42(2), 127-135.

Soler, J., et al. (2013). Validación de la versión española de la Borderline Symptom List (BSL-23). *Actas Españolas de Psiquiatría*, 41(3), 145-152.