

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Escala del Centro de Estudios Epidemiológicos de la Depresión (CES-D)

Eje I • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1 Identificación

Nombre	Escala del Centro de Estudios Epidemiológicos de la Depresión
Sigla	CES-D
Autores	Radloff, L. S.
Año	1977
Eje	EJE I – PROBLEMAS, SÍNTOMAS Y RIESGO
Constructo principal	Depresión y anhedonia
Población	Adultos y adolescentes
Tipo de instrumento	Cuestionario de autoinforme
Disponibilidad en español	Sí (Grzywacz et al., 2006; Soler et al., 1997)
Acceso/licencia	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Nota curatorial de derechos	No asumir que artículo OA implica licencia del instrumento.

2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Depresión y anhedonia. La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

Dominio conceptual	Problemas, Síntomas y Riesgo (General)
Dimensiones declaradas	4 factores (Afecto depresivo, Afecto positivo, Retraso somático/actividad, Interpersonal).

3 Características generales

Formato	Cuestionario de autoinforme
Población objetivo	Adultos y adolescentes
Número de ítems	20 ítems.
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Formato de respuesta	Escala Likert de 4 puntos de frecuencia durante la semana pasada (0 = Raramente, a 3 = La mayor parte del tiempo).
Administración	No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial.
Tiempo estimado	No verificado en las fuentes disponibles.

4 Estructura

Dimensiones/subescalas	4 factores (Afecto depresivo, Afecto positivo, Retraso somático/actividad, Interpersonal).
Ítems	20 ítems.
Control curatorial de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Respuesta	Escala Likert de 4 puntos de frecuencia durante la semana pasada (0 = Raramente, a 3 = La mayor parte del tiempo).
Relación ítem-dimensión	No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.

5 Sistema de puntuación

Sumatoria directa (4 ítems de afecto positivo se puntúan a la inversa). Posible 0 a 60.

Regla de corrección	Sumatoria directa (4 ítems de afecto positivo se puntúan a la inversa). Posible 0 a 60.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.
Baremos	No verificado en una fuente normativa autorizada.
Control de versión	No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población.

6 Interpretación

Punto de corte estándar ≥ 16 para identificar individuos con alto riesgo de depresión clínica.

Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.

7 Evidencia psicométrica

Diseñada para medir sintomatología depresiva en población general (epidemiología). Alfa > .85.

Consistencia interna	No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.
Validez	Diseñada para medir sintomatología depresiva en población general (epidemiología). Alfa > .85.
Fiabilidad temporal	No verificado en las fuentes disponibles.
Muestra y contexto	No verificado de forma suficiente para generalización.

8 Adaptaciones

Español	Sí (Grzywacz et al., 2006; Soler et al., 1997)
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Versión exacta	Ledger curado disponible con 4 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.
Población/país	Adultos y adolescentes
Alerta de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Advertencia	Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia.

9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Depresión y anhedonia en Adultos y adolescentes, condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Radloff, L. S.; 1977.
- Disponibilidad española reportada: Sí (Grzywacz et al., 2006; Soler et al., 1997)
- Trazabilidad local: 2 archivo(s) técnicamente legible(s) y 0 PDF web verificado(s).

11 Limitaciones

- Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
- Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 0.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

13 Síntesis técnica

Constructo	Depresión y anhedonia
Población	Adultos y adolescentes
Estructura	Catálogo: 20 ítems.; 4 factores (Afecto depresivo, Afecto positivo, Retraso somático/actividad, Interpersonal).. Control curado: No fijado en el ledger estructurado.
Puntuación	Sumatoria directa (4 ítems de afecto positivo se puntúan a la inversa). Posible 0 a 60.
Interpretación	Punto de corte estándar ≥ 16 para identificar individuos con alto riesgo de depresión clínica.
Estado de fuentes	Locales válidos: 2; web PDF: 0; aislados: 0.
Estado de uso	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Decisión técnica	Ficha documental disponible. La aptitud clínica requiere protocolo autorizado, versión fijada y verificación por profesional competente.

14 Referencias APA 7

Radloff, L. S. (1977). Escala del Centro de Estudios Epidemiológicos de la Depresión.

Fuente de referencia del catálogo: Disponible en repositorios de salud pública.

<https://doi.org/10.1177/014662167700100306>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3466285/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9412163/>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3466285/pdf/pone.0045413.pdf>

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.

Verificación técnica y trazabilidad — revisión 2026-08-10

Esta sección prevalece sobre datos anteriores cuando existe conflicto. Se cotejó el activo local y se usaron únicamente fuentes identificables. 'No verificado' significa que no se encontró evidencia suficiente; no es una inferencia ni una reconstrucción.

1. Versión exacta y activo cotejado	CES-D española, forma local de 20 reactivos. Activo cotejado: Protocolo.pdf, SHA-256 d8d6eb4689f2dfcb2f757f5f3bf04a3e3c44fa408836fec4e746c2faaa466e99.
2. Población e informante	Ficha previa: Adultos y adolescentes. Confirmar límites etarios, contexto e informante en el manual de la versión exacta.
3. Administración	Autoinforme.
4. Tiempo de aplicación	NO VERIFICADO: el formulario no informa una duración y no se localizó una fuente primaria específica de esta forma.
5. Estructura e ítems reales	CES-D española, forma local de 20 reactivos.
6. Periodo temporal	Última semana.
7. Escala/formato de respuesta	Frecuencia 0–3.
8. Algoritmo de puntuación	Sumar 20 ítems 0–3 tras invertir los reactivos positivos 4, 8, 12 y 16; rango 0–60. Cualquier corte debe citar versión y población.
9. Manejo de omisiones	NO VERIFICADO: no se encontró una regla explícita y legítima para datos faltantes de la versión exacta. No imputar ni prorratear sin manual.
10. Psicometría específica español/LatAm	NO VERIFICADO de forma específica para esta versión, idioma y población española/latinoamericana. La mera existencia de estudios o de una traducción no acredita equivalencia.
11. Baremos, cortes e interpretación	Punto de corte estándar ≥ 16 para identificar individuos con alto riesgo de depresión clínica. Usar solo si coincide con la versión/población citada; no se asume universalidad.
12. Licencia, uso y redistribución	Estado conservador: Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir. No redistribuir/modificar hasta documentar titular y permiso de la versión exacta.
13. Referencias y fuentes verificadas	Radloff (1977), Applied Psychological Measurement, 1, 385–401. La ficha conserva la forma española local; la equivalencia exacta de esa traducción no quedó establecida con una publicación primaria.
14. Decisión de QA	PARCIALMENTE COTEJADO: estructura visible contrastada con Protocolo.pdf. Los campos marcados NO VERIFICADO siguen bloqueando una declaración de completitud clínica.