

EVMAC — Escala para la Valoración de la Manía por Clínicos (EVMAC)

Administración: Heteroaplicada

N.º de ítems: 15

Descripción, corrección e interpretación (texto íntegro de la fuente):

Derivada de la Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia, para valorar la gravedad de la sintomatología maníaca y psicótica. Sigue los criterios diagnósticos del DSM-III-R.

Consta de 15 ítems que se agrupan en 2 factores o subescalas:

Manía: formada por los 10 primeros ítems, que exploran los siguientes síntomas: humor elevado/euforia, irritabilidad/agresividad, hiperactividad motora, presión del habla, fuga de ideas, distraibilidad, grandiosidad,

necesidad de dormir, excesiva energía y juicio empobrecido.

Psicoticismo: formada por los 5 últimos ítems, explora los síntomas de pensamiento desorganizado, ideación delirante, alucinaciones, orientación y conciencia de enfermedad.

Tanto los ítems como las puntuaciones poseen criterios operativos descriptivos (los ítems de qué es lo que se pretende evaluar y cada una de las puntuaciones se acompañan de definiciones orientativas).

Entrevista semiestructurada que debe ser realizada por el clínico, preferiblemente entrenado previamente en el

uso de la escala. Al final de cada ítem se proporciona un listado de posibles preguntas para explorar ese ítem

(excepto en los ítems 4, 6 y 11).

De acuerdo con la información que obtiene en la entrevista, la procedente de otras fuentes y de su experiencia clínica, el clínico debe puntuar cada uno de los ítems utilizando una escala de intensidad que oscila entre:

0 (ausencia del síntoma).

5 (síntoma presente en gravedad extrema).

En el último ítem (conciencia de enfermedad) la puntuación oscila entre 0 (hay conciencia de enfermedad)

y 4 (nula conciencia de enfermedad).

Marco de referencia temporal: la última semana.

Existe una versión adaptada y validada en castellano (Livianos y cols., 2000).

CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN

Proporciona dos puntuaciones independientes, una de manía y otra de síntomas psicóticos

y desorganización,

que se obtienen sumando las puntuaciones en cada uno de los ítems que constituyen las escalas.

Los puntos de corte recomendados para la versión española son los siguientes:

Subescala de manía:

- 0-7: no existe manía o manía cuestionable.
- 8-15: sintomatología maníaca leve.
- 16-25: sintomatología moderada.
- 26: sintomatología grave.

Subescala de psicosis/desorganización: no existen puntos de corte; a mayor puntuación, mayor gravedad.

Fuente: The clinician-administered rating scale for mania (CARS-M): Development, reliability, and validity. Biol Psychiatry 1994; 36: 124-134