

# FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

## Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria (HADS)

Eje I • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

### 1 Identificación

|                                    |                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre</b>                      | Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria                                                               |
| <b>Sigla</b>                       | HADS                                                                                                      |
| <b>Autores</b>                     | Zigmond, A. S., & Snaith, R. P.                                                                           |
| <b>Año</b>                         | 1983                                                                                                      |
| <b>Eje</b>                         | EJE I – PROBLEMAS, SÍNTOMAS Y RIESGO                                                                      |
| <b>Constructo principal</b>        | Ansiedad y miedo                                                                                          |
| <b>Población</b>                   | Adultos (originalmente en contexto hospitalario/médico, luego general)                                    |
| <b>Tipo de instrumento</b>         | Cuestionario de autoinforme                                                                               |
| <b>Disponibilidad en español</b>   | Sí (Adaptaciones múltiples, ej. Terol et al., 2007 en España)                                             |
| <b>Acceso/licencia</b>             | Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir. |
| <b>Nota curatorial de derechos</b> | Protegido mundialmente; no descargar protocolo ni reescribir ítems.                                       |

### 2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Ansiedad y miedo. La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Dominio conceptual</b>     | Problemas, Síntomas y Riesgo (General) |
| <b>Dimensiones declaradas</b> | 2 dimensiones (Ansiedad y Depresión).  |

### 3 Características generales

|                                |                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Formato</b>                 | Cuestionario de autoinforme                                                                         |
| <b>Población objetivo</b>      | Adultos (originalmente en contexto hospitalario/médico, luego general)                              |
| <b>Número de ítems</b>         | 14 ítems en total (7 por cada subescala).                                                           |
| <b>Versión/cantidad curada</b> | No fijado en el ledger estructurado.                                                                |
| <b>Formato de respuesta</b>    | Escala Likert de 4 puntos (0 a 3, anclajes verbales varían por ítem).                               |
| <b>Administración</b>          | No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial. |
| <b>Tiempo estimado</b>         | No verificado en las fuentes disponibles.                                                           |

## 4 Estructura

|                                      |                                                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensiones/subescalas</b>        | 2 dimensiones (Ansiedad y Depresión).                                                  |
| <b>Ítems</b>                         | 14 ítems en total (7 por cada subescala).                                              |
| <b>Control curatorial de versión</b> | Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.                  |
| <b>Respuesta</b>                     | Escala Likert de 4 puntos (0 a 3, anclajes verbales varían por ítem).                  |
| <b>Relación ítem-dimensión</b>       | No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria. |
| <b>Ítems invertidos</b>              | No verificado en las fuentes disponibles.                                              |

## 5 Sistema de puntuación

Sumatoria por subescala (0 a 21 por escala). Contiene ítems inversos.

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Regla de corrección</b> | Sumatoria por subescala (0 a 21 por escala). Contiene ítems inversos.   |
| <b>Ítems invertidos</b>    | No verificado en las fuentes disponibles.                               |
| <b>Baremos</b>             | No verificado en una fuente normativa autorizada.                       |
| <b>Control de versión</b>  | No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población. |

## 6 Interpretación

Puntos de corte para cada subescala: 0-7 (Normal), 8-10 (Caso dudoso o limítrofe), 11-21 (Caso clínico establecido).

*Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.*

## 7 Evidencia psicométrica

Excluye síntomas somáticos para evitar solapamiento con enfermedades físicas. Subescala de ansiedad muestra alfa > .80.

|                             |                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consistencia interna</b> | No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.                                                          |
| <b>Validez</b>              | Excluye síntomas somáticos para evitar solapamiento con enfermedades físicas. Subescala de ansiedad muestra alfa > .80. |
| <b>Fiabilidad temporal</b>  | No verificado en las fuentes disponibles.                                                                               |
| <b>Muestra y contexto</b>   | No verificado de forma suficiente para generalización.                                                                  |

## 8 Adaptaciones

|                                |                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Español</b>                 | Sí (Adaptaciones múltiples, ej. Terol et al., 2007 en España)                                                      |
| <b>Versión/cantidad curada</b> | No fijado en el ledger estructurado.                                                                               |
| <b>Versión exacta</b>          | Ledger curado disponible con 2 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.                            |
| <b>Población/país</b>          | Adultos (originalmente en contexto hospitalario/médico, luego general)                                             |
| <b>Alerta de versión</b>       | Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.                                              |
| <b>Advertencia</b>             | Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia. |

## 9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Ansiedad y miedo en Adultos (originalmente en contexto hospitalario/médico, luego general), condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

## 10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Zigmond, A. S., & Snaith, R. P.; 1983.
- Disponibilidad española reportada: Sí (Adaptaciones múltiples, ej. Terol et al., 2007 en España)
- Trazabilidad local: 0 archivo(s) técnicamente legible(s) y 0 PDF web verificado(s).

## 11 Limitaciones

- Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
- Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 0.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

## 12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

## 13 Síntesis técnica

|                          |                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Constructo</b>        | Ansiedad y miedo                                                                                                                                 |
| <b>Población</b>         | Adultos (originalmente en contexto hospitalario/médico, luego general)                                                                           |
| <b>Estructura</b>        | Catálogo: 14 ítems en total (7 por cada subescala).; 2 dimensiones (Ansiedad y Depresión).. Control curado: No fijado en el ledger estructurado. |
| <b>Puntuación</b>        | Sumatoria por subescala (0 a 21 por escala). Contiene ítems inversos.                                                                            |
| <b>Interpretación</b>    | Puntos de corte para cada subescala: 0-7 (Normal), 8-10 (Caso dudoso o límite), 11-21 (Caso clínico establecido).                                |
| <b>Estado de fuentes</b> | Locales válidos: 0; web PDF: 0; aislados: 0.                                                                                                     |
| <b>Estado de uso</b>     | Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.                                        |
| <b>Decisión técnica</b>  | Ficha documental disponible. La aptitud clínica requiere protocolo autorizado, versión fijada y verificación por profesional competente.         |

## 14 Referencias APA 7

Zigmond, A. S., & Snaith, R. P. (1983). Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria.

Fuente de referencia del catálogo: Disponible en múltiples publicaciones científicas.

<https://eprovide.mapi-trust.org/instruments/hospital-anxiety-and-depression-scale>

[https://doi.org/10.1016/S0163-8343\(03](https://doi.org/10.1016/S0163-8343(03)

*Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.*

## Verificación técnica y trazabilidad — revisión 2026-08-10

Esta sección prevalece sobre datos anteriores cuando existe conflicto. Se cotejó el activo local y se usaron únicamente fuentes identificables. 'No verificado' significa que no se encontró evidencia suficiente; no es una inferencia ni una reconstrucción.

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Versión exacta y activo cotejado</b>      | NO COTEJABLE: no existe Protocolo.pdf local. Debe adquirirse/obtenerse la forma oficial antes de fijar edición, idioma y versión.                                                                                                            |
| <b>2. Población e informante</b>                | Ficha previa: Adultos (originalmente en contexto hospitalario/médico, luego general). Confirmar límites etarios, contexto e informante en el manual de la versión exacta.                                                                    |
| <b>3. Administración</b>                        | NO VERIFICADO: sin protocolo/manual oficial local.                                                                                                                                                                                           |
| <b>4. Tiempo de aplicación</b>                  | NO VERIFICADO: el formulario no informa una duración y no se localizó una fuente primaria específica de esta forma.                                                                                                                          |
| <b>5. Estructura e ítems reales</b>             | Ficha previa declara: 14 ítems en total (7 por cada subescala).. NO VERIFICADO contra un protocolo oficial.                                                                                                                                  |
| <b>6. Periodo temporal</b>                      | NO VERIFICADO: sin protocolo/manual oficial local.                                                                                                                                                                                           |
| <b>7. Escala/formato de respuesta</b>           | Ficha previa: Escala Likert de 4 puntos (0 a 3, anclajes verbales varían por ítem).. NO VERIFICADO contra un protocolo oficial.                                                                                                              |
| <b>8. Algoritmo de puntuación</b>               | NO VERIFICADO PARA USO OPERATIVO. Descripción previa: No verificado. Confirmar con manual/clave de la forma exacta antes de aplicar.                                                                                                         |
| <b>9. Manejo de omisiones</b>                   | NO VERIFICADO: no se encontró una regla explícita y legítima para datos faltantes de la versión exacta. No imputar ni prorratear sin manual.                                                                                                 |
| <b>10. Psicometría específica español/LatAm</b> | Validación española N=685; alfa=.86 para Ansiedad y .86 para Depresión; test-retest >.85; estructura bifactorial. Quintana et al. (2003).                                                                                                    |
| <b>11. Baremos, cortes e interpretación</b>     | Puntos de corte para cada subescala: 0-7 (Normal), 8-10 (Caso dudoso o limitrofe), 11-21 (Caso clínico establecido). Usar solo si coincide con la versión/población citada; no se asume universalidad.                                       |
| <b>12. Licencia, uso y redistribución</b>       | COMERCIAL/RESTRINGIDO: GL Assessment. Artículos psicométricos no autorizan reproducir la escala.                                                                                                                                             |
| <b>13. Referencias y fuentes verificadas</b>    | Quintana et al. (2003), Acta Psychiatrica Scandinavica, 107, 216–221, doi:10.1034/j.1600-0447.2003.00062.x, <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12580829/">https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12580829/</a> . Distribución: GL Assessment. |
| <b>14. Decisión de QA</b>                       | SOLO FICHA / PENDIENTE: no hay protocolo local; no aplicar ni reconstruir ítems. Obtener forma oficial o documentar que no fue localizada.                                                                                                   |