

ISCA — Interrogatorio Sistematizado de Consumos Alcohólicos (ISCA)

Administración: Heteroaplicada

N.º de ítems: 3

Descripción, corrección e interpretación (texto íntegro de la fuente):

El ISCA es un cuestionario diseñado para detectar precozmente bebedores de riesgo en el ámbito de atención primaria.

Evalúa el consumo alcohólico teniendo en cuenta tanto los patrones regulares como irregulares de consumo

semanal que se dan en la población general.

Consta de 3 preguntas de tipo cantidad-frecuencia:

La primera explora el consumo de alcohol.

La segunda, la frecuencia de los consumos.

La tercera, las variaciones de consumo entre días laborales y festivos.

La rejilla de respuestas es rellenada por el clínico y en ella se registran:

Las cantidades habitualmente consumidas en días laborales y en días festivos, convertidas a Unidades de

bebida estándar (UBE) cuyo contenido alcohólico se sitúa en 10 g.

El número de días de consumo en una semana normal.

Se trata de un instrumento heteroaplicado.

CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN

Multiplicando ambos índices (cantidad y días) y sumando los subtotales se obtiene un resultado final.

El resultado final es un cálculo del consumo semanal de alcohol medido en UBE.

Los puntos de corte propuestos por los autores (o lo que es lo mismo, serían bebedores de riesgo), son los

siguientes:

Hombres: 28 puntos.

Mujeres: 17 puntos (en el caso de estas últimas recomiendan valorar los casos cuyo ISCA se sitúe entre 11 y 16).

© Psiquiatría Editores, S.L.

22 Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica

3.6 Escala para la Evaluación de la Abstinencia Alcohólica

(revisada) del Addiction Research Foundation Clinical Institute

(Revised Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol Scale, CIWA-Ar)

Autores J. T. Sullivan, K. Sykora, J. Schneiderman, C. A. Naranjo, E. M. Sellers.

Referencia Assessment of alcohol withdrawal: the revised Clinical Institute Withdrawal Assessment

for Alcohol Scale (CIWA-Ar). Br J Add 1989; 84: 1353-1357.

Evalúa Gravedad del síndrome de abstinencia de alcohol.

N.º de ítems 10.

Administración Heteroaplicada.

DESCRIPCIÓN

La CIWA-Ar es un instrumento diseñado para evaluar la intensidad de la sintomatología de la abstinencia de alcohol.

Se trata de una entrevista semiestructurada de 10 ítems, en los que se evalúan diferentes signos y síntomas relacionados con la abstinencia alcohólica (náuseas y vómitos, temblor, sudoración paroxística, ansiedad, agitación, alteraciones táctiles, alteraciones auditivas, alteraciones visuales, cefalea y pesadez de cabeza y orientación y aturdimiento).

En los ítems 1-9 se emplea una escala de intensidad de 8 puntos (ausencia del signo/síntoma, 0; intensidad máxima, 7). En el último ítem se utiliza una escala de intensidad de 5 puntos (orientado y con capacidad de respuesta serial, 0; desorientación temporoespacial, 4).

Es un instrumento heteroaplicado.

No existe validación española del instrumento.

CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN

Proporciona una puntuación total que se obtiene sumando las puntuaciones en los 10 signos y síntomas explorados.

En cada signo/síntoma evaluado las puntuaciones oscilan entre 0 y 7, excepto en el último (orientación y obnubilación sensorial), que se puntúa de 0 a 4. Por tanto, el rango de puntuaciones oscila entre 0 y 67.

Los autores recomiendan utilizar los siguientes puntos de corte:

0-9: abstinencia leve (se podría administrar una medicación ligera o incluso prescindir de ella).

10-20: abstinencia moderada (se recomienda establecer una pauta terapéutica de síndrome de abstinencia leve-moderado).

21-67: abstinencia grave (se recomienda desintoxicación hospitalaria).

© Psiquiatría Editores, S.L.

3. Instrumentos de evaluación para los trastornos debidos al consumo de sustancias psicotropas: alcohol y otras drogas 23

Fuente: El ISCA (Interrogatorio Sistematizado de Consumos Alcohólicos), un nuevo instrumento para la identificación precoz de bebedores de riesgo. Med Clin (Barc) 2001; 117: 685-689