

MALT — Münchner Alkoholismus Test (MALT)

Administración: MALT-O: heteroaplicada; MALT-S: autoaplicada

N.º de ítems: MALT-O: 7; MALT-S: 27

Descripción, corrección e interpretación (texto íntegro de la fuente):

El MALT está formado por dos partes:

MALT-O (MALT objetivo): constituido por 7 ítems indicadores orgánicos de la dependencia alcohólica.

MALT-S (MALT subjetivo): formado por 27 ítems sobre la percepción subjetiva del paciente sobre sus pro-

blemas con el alcohol (dependencia psicológica).

Todos los ítems tienen una respuesta dicotómica sí/no.

La parte objetiva (MALT-O) ha de ser administrada por el clínico, mientras que la parte subjetiva (MALT-S) es

cumplimentada por el propio paciente.

Aunque se diferencie en dos partes, el MALT debe ser contemplado e interpretado en su conjunto.

CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN

Proporciona una puntuación total que se obtiene sumando las puntuaciones en los 34 ítems.

En el MALT-O, la respuesta afirmativa vale 4 puntos y la negativa 0. En el MALT-S, la respuesta afirmativa vale

1 punto y la negativa 0 puntos.

Los autores recomiendan utilizar los siguientes puntos de corte:

0-5: no problemas relacionados con el alcohol.

6-10: sospecha de alcoholismo.

11: alcoholismo.

Fuente: Diagnose des Alkoholismus: Der Münchner Alkoholismustest (MALT). Münch Med Wochf 1977; 119: 1275-1282