

OCDS — Cuestionario sobre los Componentes Obsesivo-Compulsivos de la Bebida (Obsessive Compulsive Drinking Scale, OCDS)

Administración: Autoaplicada

N.º de ítems: 14

Descripción, corrección e interpretación (texto íntegro de la fuente):

El OCDS es un cuestionario diseñado para valorar la preocupación por la bebida (componente obsesivo) y el consumo (componente compulsivo).

Consta de 14 ítems que se agrupan en 2 subescalas:

Componente obsesivo (ítems 1 a 6).

Componente compulsivo (ítems 7 a 14).

Cada pregunta tiene 5 posibles respuestas tipo Likert, que se puntúan de 0-4.

Es un instrumento autoaplicado.

CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN

La puntuación de cada subescala se calcula sumando 5 valores. Unos se obtienen de preguntas aisladas y otros

de la puntuación más alta obtenida en pares de preguntas:

Subescala del componente obsesivo: se suman los valores de las preguntas 3, 4, 5 y 6 y la puntuación más alta

alcanzada en el par de preguntas 1 y 2.

Subescala del componente compulsivo: se suman las puntuaciones de las preguntas 11 y 12 y las máximas

puntuaciones alcanzadas en los siguientes pares de preguntas, 7 y 8, 9 y 10, y 13 y 14.

La puntuación total se obtiene sumando las puntuaciones obtenidas en cada subescala.

No existen puntos de corte propuestos. Cuanto mayor es la gravedad de la dependencia alcohólica, mayores son

las puntuaciones del componente obsesivo, compulsivo y del total de la escala.

Puntuaciones medias (DE) obtenidas en la validación española:

Componente obsesivo: 9,5 (4,8).

Componente compulsivo: 15,2 (3,5).

Puntuación total: 22,5 (7,5).

Fuente: The Obsessive Compulsive Drinking Scale: A self rated instrument for the quantification of thoughts about alcohol and drinking behavior. Alcohol Clin Exp Res 1995; 19: 92-99