

PCL-5 (Spanish) — Lista de Verificación del TEPT para el DSM-5

Traducción al español (Satarino), distribuida públicamente por Los Angeles County Department of Mental Health.

Instrumento original: Weathers, F.W., Litz, B.T., Keane, T.M., Palmieri, P.A., Marx, B.P., & Schnurr, P.P. (2013). National Center for PTSD.

Instrucciones

Este cuestionario pregunta acerca de los problemas que usted pudo haber tenido después de una experiencia muy estresante que implica la muerte real o amenaza, lesiones graves o violencia sexual. Podría ser algo que le haya pasado directamente, algo que fue testigo, o algo que le haya pasado a un familiar cercano o un amigo cercano.

Primero identifique brevemente su peor caso (el que actualmente le molesta más). Luego, teniendo este evento en mente, indique cuánto le ha molestado cada uno de los siguientes problemas en el último mes.

Escala: 0 = No del todo 1 = Un Poco 2 = Moderado 3 = Mucho 4 = Extremadamente

En el mes pasado, ¿cuánto le ha molestado tener...?

1. ¿Recuerdos repetitivos, inquietantes o no deseados de la experiencia estresante? [0 1 2 3 4]
2. ¿Sueños repetitivos e inquietantes de la experiencia estresante? [0 1 2 3 4]
3. ¿Repentinamente sintiéndose o actuando como si la experiencia estresante está pasando en realidad? (Como si estuviera en realidad reviviendo la experiencia) [0 1 2 3 4]
4. ¿Sintiendo enojo cuando algo le recuerda esa experiencia estresante? [0 1 2 3 4]
5. ¿Tiene fuertes reacciones físicas cuando algo le recuerda esa experiencia estresante? (Por ejemplo, fuertes latidos del corazón, problemas para respirar, sudor) [0 1 2 3 4]
6. ¿El evitar recuerdos, pensamientos o sentimientos relacionados con la experiencia estresante? [0 1 2 3 4]
7. ¿Evitar cosas externas que le recuerden la experiencia estresante? (Por ejemplo personas, lugares, conversaciones, actividades, objetos u otras situaciones) [0 1 2 3 4]
8. ¿Problemas recordando hechos importantes de la experiencia estresante? [0 1 2 3 4]

9. ¿Tener fuertes convicciones negativas de usted mismo, otras personas, o el mundo (por ejemplo si tiene pensamientos como: Soy malo, hay algo seriamente malo conmigo, no puedo confiar en nadie, nuestro mundo es sumamente peligroso)? [0 1 2 3 4]
10. ¿Culpa a sí mismo o a alguien por la experiencia estresante o lo que ocurrió después de eso? [0 1 2 3 4]
11. ¿Tener fuertes sentimientos negativos como temor, horror, enojo, culpabilidad o vergüenza? [0 1 2 3 4]
12. ¿Pérdida de interés en actividades que usted disfrutaba? [0 1 2 3 4]
13. ¿Al sentirse distante o separado de otras personas? [0 1 2 3 4]
14. ¿Dificultad para experimentar sentimientos positivos (por ejemplo, al ser incapaz de sentirse feliz o tener sentimientos de amor para las personas cercanas a usted)? [0 1 2 3 4]
15. ¿Comportamiento irritable, arranques de enojo o comportamiento agresivo? [0 1 2 3 4]
16. ¿Tomar muchos riesgos o hacer cosas que puedan causar daño? [0 1 2 3 4]
17. ¿Estar en "sobre alerta" o vigilante o en guardia? [0 1 2 3 4]
18. ¿Sentir nerviosismo o fácilmente asustado? [0 1 2 3 4]
19. ¿Al tener dificultad para concentrarse? [0 1 2 3 4]
20. ¿Dificultad para dormir o quedarse dormido? [0 1 2 3 4]

Puntuación

Suma de los 20 ítems (rango 0-80). Un cambio de 5-10 puntos se considera un cambio confiable; un cambio de 10-20 puntos indica un cambio clínicamente significativo. Punto de corte provisional sugerido por el National Center for PTSD: 31-33.