

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Escala de Estrés y Evitación Social (SADS)

Eje I • Versión de trabajo: 10 de septiembre de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

Familia / sigla	SADS
Nombre completo	Social Avoidance and Distress Scale — Escala de Estrés y Evitación Social
Versión / edición	Versión de 28 ítems dicotómicos, adaptación española de Bobes, Badía, Luque, García-Portilla, González y Bascarán (2002).
Idioma	Español (España).
Autores (original)	Watson, D., & Friend, R. (1969). Adaptación española: Bobes, J., et al. (2002).
Año (original / adaptación)	1969 (original); 2002 (adaptación y validación española, junto con SIAS).
Eje primario	Eje I — Problemas, síntomas y riesgo
Etiquetas	Fobia social; ansiedad social; evitación social; malestar subjetivo.
Pregunta clínica que responde	¿Predomina en la persona el malestar subjetivo en situaciones sociales, la evitación conductual activa de esas situaciones, o ambos, y en qué grado?
Población	Adolescentes y adultos.
Contexto de aplicación	Evaluación clínica de fobia social, investigación en psicología clínica, monitoreo de intervenciones cognitivo-conductuales de exposición y entrenamiento en habilidades sociales.
Informante	Autoinforme.
Modalidad de administración	Papel y lápiz; 5-10 minutos.
Número de ítems	28 ítems dicotómicos (verdadero/falso), verificado en la ficha técnica fuente: 14 de la subescala de Malestar/Ansiedad Social (SAD) y 14 de la subescala de Evitación Social (SNS).
Periodo temporal de referencia	No verificado en las fuentes consultadas (formato de rasgo general, sin marco temporal explícito indicado).
Formato de respuesta	Dicotómico: Verdadero / Falso.
Tiempo estimado de aplicación	5 a 10 minutos (declarado en la ficha técnica fuente).
Regla de puntuación	1 punto por cada respuesta que coincide con la clave de patología, 0 en caso contrario. Ítems puntuados Verdadero=1: 2,5,8,10,11,13,14,16,18,20,21,23,24,26. Ítems puntuados Falso=1 (invertidos):

	1,3,4,6,7,9,12,15,17,19,22,25,27,28. Puntuación global: suma de las 28 respuestas patológicas (rango 0-28); subescalas SAD y SNS de 0-14 cada una.
Ítems invertidos	14 ítems puntuados en sentido Falso=1: 1,3,4,6,7,9,12,15,17,19,22,25,27,28 (ver regla de puntuación).
Ítems omitidos / reglas de omisión	No verificado en las fuentes consultadas.
Rango posible	0-28 (total); 0-14 por subescala.
Puntos de corte	La ficha técnica fuente reporta: 0-8 = ansiedad/evitación social baja o normal; 9-15 = moderada; 16-28 = alta (sugiere fobia social severa). No verificado de forma independiente contra el artículo original de Bobes et al. (2002) en esta sesión.
Activos disponibles	Protocolo.pdf (formulario de 28 ítems, copiado desde Downloads/Instrumentos/Eje I/SADS/SADS_Scale.pdf de la raíz del proyecto). Ficha_Tecnica.docx / .pdf.
Hash / verificación	Ver MANIFIESTO_SHA256.csv del proyecto.
Estado QA	Familia nueva, incorporada 2026-09-10 desde carpeta suelta de la raíz. IMPORTANTE: no confundir esta sigla con el instrumento de riesgo suicida ERS ni con la escala de diagnóstico psiquiátrico SADS (Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia) usada en otros contextos — aquí SADS corresponde exclusivamente a Social Avoidance and Distress Scale (Watson y Friend, 1969). Ficha construida a partir de SADS_Ficha.pdf (carpeta suelta) y verificación directa del formulario administrable. Validada en el mismo artículo español que Eje I/SIAS. No se verificó independientemente el artículo original contra fuente primaria en esta sesión. Requiere revisión humana antes de uso clínico.
Fecha	2026-09-10
Responsable	Claude — proceso automatizado, requiere revisión humana
Versión de la ficha	1.0

3. Constructo, finalidad y usos

Constructo evaluado: ansiedad social, en dos aspectos diferenciados — malestar/ansiedad social (respuesta afectiva subjetiva de tensión en interacciones) y evitación social (respuesta conductual de evitación o escape de situaciones sociales).

Finalidad: medir la ansiedad social subjetiva y el comportamiento de evitación de situaciones sociales, distinguiendo el componente afectivo del conductual.

Usos apropiados

Evaluación clínica de fobia social, distinguiendo si el cuadro es predominantemente afectivo o conductual.

Monitoreo de intervenciones cognitivo-conductuales de exposición y entrenamiento en habilidades sociales.

Usos NO apropiados

Diagnóstico autónomo sin contextualizar el resultado en la historia vital y de desarrollo del sujeto (recomendación de la ficha técnica fuente).

Confundir esta sigla con otros instrumentos que comparten las mismas siglas en otros contextos clínicos (ver Estado QA).

9. Adaptación cultural y norma local

Validada en España por Bobes et al. (2002) junto con la escala SIAS; la ficha técnica fuente reporta alfa de Cronbach entre 0.90 y 0.94, fiabilidad test-retest a un mes de 0.86, y adecuada estabilidad transcultural. No verificado de forma independiente contra el artículo original en esta sesión.

10. Límites clínicos, seguridad, derivación y no-diagnóstico

El formato dicotómico (V/F) puede limitar los matices de intensidad de respuesta (limitación señalada en la ficha técnica fuente).

No sustituye una entrevista clínica estructurada ni el juicio profesional.

11. Titular, licencia y condiciones de reproducción

Publicada originalmente en Journal of Consulting and Clinical Psychology (Watson & Friend, 1969) y la adaptación española en Medicina Clínica (Bobes et al., 2002); ambas son publicaciones académicas. No se verificó de forma independiente en esta sesión la licencia exacta de reproducción del instrumento completo — no verificado, revisar antes de distribución masiva o uso comercial.

12. DOI / URL oficiales y referencias APA

Watson, D., & Friend, R. (1969). Measurement of social-evaluative anxiety. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 33(4), 448-457.

Bobes, J., Badía, X., Luque, A., García-Portilla, M. P., González, M. P., & Bascarán, M. T. (2002). Validación de las versiones en español de las escalas de fobia social SIAS y SADS. Medicina Clínica, 118(12), 445-449.