

Y-BOCS — Escala de Obsesiones y Compulsiones de Yale-Brown (entrevista clínica)

Autores originales: Goodman, W.K., Price, L.H., Rasmussen, S.A., Mazure, C., Fleischmann, R.L., Hill, C.L., Heninger, G.R. & Charney, D.S. (1989). Arch Gen Psychiatry, 46, 1006-1011 y 1012-1016.

Fuentes verificadas: (1) Anexo 1, Buz & tesis de la Universidad de Zaragoza (zaguan.unizar.es, repositorio institucional abierto) — anclas descriptivas completas para los 10 ítems nucleares; (2) CIBERSAM, Biblioteca de Instrumentos (biadmin.cibersam.es) — hoja de puntuación con los ítems adicionales 11-19 de la versión extendida.

Administración: debe ser completada por el clínico, sobre la base de la entrevista clínica y demás información recabada sobre la persona; puede completarse preguntando directamente al paciente.

A. OBSESIONES

1. TIEMPO diario ocupado por las obsesiones (nº veces al día / horas al día): 0=Ninguno · 1=Leve (menos de 8 veces, menos de 1h/día) · 2=Moderado (más de 8 veces, entre 1-3h/día) · 3=Grave (más de 8 veces, entre 3-8h/día) · 4=Extremo (constante, más de 8h/día)
2. INTERFERENCIA debida a las obsesiones: 0=Ninguna · 1=Interferencia leve, puede realizar normalmente actividades diarias · 2=Interfiere pero es manejable · 3=Perjuicio evidente en actividades · 4=Le incapacita totalmente
3. MALESTAR provocado por las obsesiones: 0=Ninguno · 1=Ligero, infrecuente · 2=Molesta pero es tolerable · 3=Frecuentemente molestan mucho, muy perturbadoras · 4=Malestar constante, incapacitante
4. RESISTENCIA contra las obsesiones: 0=Siempre se resiste o no hace falta · 1=Se resiste casi siempre · 2=Se esfuerza algo por resistirse · 3=Cede, no intenta controlar, lo vive mal · 4=Cede por completo voluntariamente, ni se lo plantea
5. GRADO DE CONTROL sobre las obsesiones: 0=Control total · 1=Mucho control, capaz de detenerlas muchas veces · 2=Control moderado, pocas veces consigue pararlas · 3=Control escaso, casi nunca lo consigue · 4=Ningún control, se experimentan como fuera de la voluntad

Subtotal de obsesiones (suma ítems 1-5): _____

B. COMPULSIONES

6. TIEMPO diario ocupado por las compulsiones: mismas anclas 0-4 que el ítem 1

7. INTERFERENCIA debida a las compulsiones: mismas anclas 0-4 que el ítem 2
8. MALESTAR provocado por las compulsiones: mismas anclas 0-4 que el ítem 3
9. RESISTENCIA contra las compulsiones: mismas anclas 0-4 que el ítem 4
10. GRADO DE CONTROL sobre las compulsiones: mismas anclas 0-4 que el ítem 5
- Subtotal de compulsiones (suma ítems 6-10): _____

PUNTUACIÓN TOTAL (ítems 1 a 10): _____

Puntos de corte orientativos: 0-7 sin manifestaciones clínicas · 8-15 leve · 16-23 moderado · 24-31 severo · 32-40 extremo.

ÍTEMS ADICIONALES (versión extendida, 11-19 — estructura verificada vía CIBERSAM, sin anclas detalladas disponibles en la fuente)

11. Insight (conciencia de enfermedad): 0=Excelente ... 4=Ausente
12. Evitación: 0-4
13. Indecisión: 0-4
14. Responsabilidad: 0-4
15. Enlentecimiento: 0-4
16. Duda patológica: 0-4
17. Gravedad global: 0-4
18. Mejoría global: 0-4
19. Fiabilidad: 0=Excelente · 1=Buena · 2=Moderada · 3=Pobre

Nota de verificación: las anclas descriptivas completas para los ítems 11-19 (redacción exacta de cada nivel de severidad) no se encontraron en ninguna fuente abierta revisada en esta sesión — solo su estructura de puntuación (0-4). No reconstruir esas anclas sin una fuente verificable; los ítems 1-10 (núcleo Y-BOCS) sí están completos y verificados.

Nota de diferenciación: esta familia corresponde a la entrevista clínica Y-BOCS original (heteroaplicada). Es DISTINTA de la versión autoinformada Y-BOCS-SR (Self-Report), que el catálogo previo había confundido con esta ficha.