

YMRS — Escala de Young para la Evaluación de la Manía (YMRS)

Administración: Heteroaplicada

N.º de ítems: 11

Descripción, corrección e interpretación (texto íntegro de la fuente):

Constituida por 11 ítems que evalúan los síntomas de la manía, por lo que uso no resulta tan apropiado en los

pacientes con trastorno bipolar II.

Los ítems han de ser puntuados por el clínico basándose en el relato del paciente y en su propia observación. Para

puntuar dispone de una escala de intensidad que oscila unas veces entre 0 y 4, y otras veces entre 0 y 8 (ítems 5,

6, 8 y 9). Estos 4 ítems tienen el doble de valor para compensar la pobre cooperación de los pacientes maníacos

graves.

En todos los casos, el valor 0 hace referencia a ausencia del síntoma, y el valor más alto a presencia en grave-

dad extrema.

La escala proporciona criterios operativos para asignar la puntuación.

Marco de referencia temporal: últimas 48 horas.

Heteroaplicada por un clínico entrenado en su uso.

Está validada en español por Colom y cols. (2002).

El tiempo de duración aproximado de la entrevista es de 15-30 minutos.

CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN

Proporciona una puntuación total que es la suma de las puntuaciones en los 11 ítems. Esta puntuación total oscila

entre 0 y 60 puntos.

En general se acepta que una puntuación:

6: es compatible con eutimia.

7-20: es compatible con episodio mixto.

> 20: es compatible con episodio maníaco.

– A mayor puntuación, mayor gravedad del cuadro maníaco.

Fuente: A rating scale for mania: Reliability, validity and sensitivity. Br J Psychiatr 1978; 133: 429-435