

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Cuestionario de Metacogniciones (MCQ-30)

Eje II • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1 Identificación

Nombre	Cuestionario de Metacogniciones
Sigla	MCQ-30
Autores	Wells, A., & Cartwright-Hatton, S.
Año	2004
Eje	EJE II - PROCESOS PSICOLÓGICOS Y MECANISMOS DE MANTENIMIENTO
Constructo principal	Metacogniciones disfuncionales
Población	Adultos
Tipo de instrumento	Cuestionario de autoinforme
Disponibilidad en español	Sí (Martín-Díaz et al., 2012)
Acceso/licencia	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Nota curatorial de derechos	Artículo institucional OA; copyright UCM/Colegio Oficial de Psicólogos.

2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Metacogniciones disfuncionales. La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

Dominio conceptual	No verificado en las fuentes disponibles.
Dimensiones declaradas	5 factores (Creencias positivas sobre la preocupación, Creencias negativas sobre incontrolabilidad y peligro, Falta de confianza cognitiva, Necesidad de control de los pensamientos, Autoconciencia cognitiva).

3 Características generales

Formato	Cuestionario de autoinforme
Población objetivo	Adultos
Número de ítems	30 ítems (6 por dimensión).
Versión/cantidad curada	30
Formato de respuesta	Escala Likert de 4 puntos (1 = No de acuerdo, a 4 = Muy de acuerdo), según el literal del Protocolo.pdf.
Administración	No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial.
Tiempo estimado	No verificado en las fuentes disponibles.

4 Estructura

Dimensiones/ subescalas	5 factores (Creencias positivas sobre la preocupación, Creencias negativas sobre incontrolabilidad y peligro, Falta de confianza cognitiva, Necesidad de control de los pensamientos, Autoconciencia cognitiva).
Ítems	30 ítems (6 por dimensión).
Control curatorial de versión	No atribuir a Martín-Díaz 2012 ni reordenar por dominios.
Respuesta	Escala Likert de 4 puntos (1 = No de acuerdo, a 4 = Muy de acuerdo), según el literal del Protocolo.pdf.
Relación ítem- dimensión	No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.

5 Sistema de puntuación

Sumatoria de las subescalas y puntuación total (30 a 120).

Regla de corrección	Sumatoria de las subescalas y puntuación total (30 a 120).
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.
Baremos	No verificado en una fuente normativa autorizada.
Control de versión	No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población.

6 Interpretación

Dimensional. Puntuaciones totales > 65-70 sugieren niveles patológicos de actividad metacognitiva, característicos de trastornos de ansiedad y TOC.

Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.

7 Evidencia psicométrica

Evalúa creencias sobre el pensamiento (ej. "preocuparse es peligroso", "mis pensamientos son incontrolables"). Central en terapia metacognitiva.

Consistencia interna	No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.
Validez	Evalúa creencias sobre el pensamiento (ej. "preocuparse es peligroso", "mis pensamientos son incontrolables"). Central en terapia metacognitiva.
Fiabilidad temporal	No verificado en las fuentes disponibles.
Muestra y contexto	No verificado de forma suficiente para generalización.

8 Adaptaciones

Español	Ramos-Cejudo, Salguero y Cano-Vindel (2013).
Versión/cantidad curada	30
Versión exacta	Ledger curado disponible con 3 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.
Población/país	Adultos
Alerta de versión	No atribuir a Martín-Díaz 2012 ni reordenar por dominios.
Advertencia	Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia.

9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Metacogniciones disfuncionales en Adultos, condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Wells, A., & Cartwright-Hatton, S.; 2004.
- Disponibilidad española reportada: Sí (Martín-Díaz et al., 2012)
- Trazabilidad local: 0 archivo(s) técnicamente legible(s) y 1 PDF web verificado(s).

11 Limitaciones

- Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
- No atribuir a Martín-Díaz 2012 ni reordenar por dominios.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 0.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

13 Síntesis técnica

Constructo	Metacogniciones disfuncionales
Población	Adultos
Estructura	Catálogo: 30 ítems (6 por dimensión).; 5 factores (Creencias positivas sobre la preocupación, Creencias negativas sobre incontrolabilidad y peligro, Falta de confianza cognitiva, Necesidad de control de los pensamientos, Autoconciencia cognitiva).. Control curado: 30
Puntuación	Sumatoria de las subescalas y puntuación total (30 a 120).
Interpretación	Dimensional. Puntuaciones totales > 65-70 sugieren niveles patológicos de actividad metacognitiva, característicos de trastornos de ansiedad y TOC.
Estado de fuentes	Locales válidos: 0; web PDF: 1; aislados: 0.
Estado de uso	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Decisión técnica	Ficha documental disponible. La aptitud clínica requiere protocolo autorizado, versión fijada y verificación por profesional competente.

14 Referencias APA 7

Wells, A., & Cartwright-Hatton, S. (2004). Cuestionario de Metacogniciones.

Fuente de referencia del catálogo: Repositorios de escalas metacognitivas.

https://www.ucm.es/data/cont/docs/491-2013-11-20-Spanish_Version_of_MCQ_30_Ramos-Cejudo%20et%20al.%2C%202013.pdf

[https://doi.org/10.1016/S0005-7967\(03](https://doi.org/10.1016/S0005-7967(03)

<https://doi.org/10.1017/sjp.2013.95>

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.

Verificación técnica y trazabilidad — revisión 2026-08-10

Esta sección prevalece ante conflictos. Solo incorpora hechos observados en el activo o fuentes legítimas identificadas; todo lo demás queda como NO VERIFICADO.

1. Versión exacta y activo cotejado	MCQ-30 española de Ramos-Cejudo, Salguero y Cano-Vindel (2013), 30 ítems. Activo: Protocolo.pdf, SHA-256 92de4f1d59160d48291f8282b5b03a8ed578a15f02d47f9a9ab9bc40d05a89e8.
2. Población e informante	Ficha previa: Adultos. Confirmar edad, contexto e informante para la versión exacta.
3. Administración	Autoinforme.
4. Tiempo de aplicación	NO VERIFICADO en una fuente primaria de la forma exacta.
5. Estructura e ítems reales	MCQ-30 española de Ramos-Cejudo, Salguero y Cano-Vindel (2013), 30 ítems.
6. Periodo temporal	Sin periodo; creencias metacognitivas generales.
7. Escala/formato de respuesta	Likert 1-4.
8. Algoritmo de puntuación	Sumar 30 ítems 1-4: total 30-120. Calcular cinco subescalas de seis ítems (6-24 cada una) con la clave de Ramos-Cejudo et al. (2013); no reordenar ítems por dominios.
9. Manejo de omisiones	NO VERIFICADO: no imputar, prorratear ni interpretar perfiles incompletos sin regla explícita de la versión exacta.
10. Psicometría específica español/LatAm	Ramos-Cejudo, Salguero y Cano-Vindel (2013) constituyen la adaptación española específica; consultar el artículo institucional para coeficientes/factores.
11. Baremos, cortes e interpretación	Dimensional. Puntuaciones totales > 65-70 sugieren niveles patológicos de actividad metacognitiva, característicos de trastornos de ansiedad y TOC. No universalizar cortes ni baremos; exigir versión y población coincidentes.
12. Licencia, uso y redistribución	Artículo institucional OA; copyright UCM/Colegio Oficial de Psicólogos. Acceso a un artículo no equivale a permiso para reproducir el test.
13. Referencias y fuentes verificadas	Fuente oficial/primaria: https://www.ucm.es/data/cont/docs/491-2013-11-20-Spanish_Version_of_MCQ_30_Ramos-Cejudo%20et%20al.%2C%202013.pdf Español: Ramos-Cejudo, Salguero y Cano-Vindel (2013). Alerta: No atribuir a Martín-Díaz 2012 ni reordenar por dominios.
14. Decisión de QA	PARCIALMENTE COTEJADO: el contenido visible fue contrastado; los campos NO VERIFICADO impiden declarar completitud clínica.