

MEC — Mini-Examen Cognoscitivo (MEC)

Administración: Heteroaplicada

N.º de ítems: 13

Descripción, corrección e interpretación (texto íntegro de la fuente):

El MEC es un instrumento diseñado para la detección de casos de deterioro cognitivo.

En total el paciente ha de contestar o realizar 30 cuestiones, que exploran las siguientes áreas cognitivas:

Orientación temporal y espacial.

Memoria inmediata.

Concentración y cálculo.

Memoria diferida.

Lenguaje y praxis.

Es un instrumento heteroaplicado, sencillo y rápido de administrar (5-10 minutos).

Existen dos versiones en castellano que son ligeramente diferentes. La que se presenta en esta guía práctica, el

Mini-Examen Cognoscitivo (MEC), es la versión que ha sido adaptada y validada por Lobo y cols. (1975).

La otra versión existente se denomina Test Mini-Mental y difiere de la de Lobo en los siguientes ítems:

Memoria de fijación: deja a la elección del entrevistador las 3 palabras que va a tener que repetir.

Concentración y cálculo: da 2 opciones:

– Bien restar de 7 en 7 a partir de 100.

– Bien deletrear la palabra «mundo» al revés.

Lenguaje y construcción: la frase que ha de repetir el paciente es: «ni sí, ni no, ni pero».

CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN

Orientación: cada respuesta correcta es 1 punto. Máximo 10 puntos.

Memoria de fijación: decir despacio y claramente cada una de las palabras. Repetirlas tantos intentos como sea

necesario hasta que se las aprenda (ya que es imprescindible para que luego las pueda recordar). Hacer hincapié

en que debe intentar recordarlas porque más tarde se las vamos a volver a preguntar. Cada palabra repetida

correctamente en el primer intento vale 1 punto. Máximo 3 puntos.

Concentración-cálculo:

Restar de 30 1: se le puede ayudar un poco si tiene dificultades de comprensión. La ayuda que se le puede dar no

debe ser más de: «Si tiene 30 1 y me da 3, ¿cuántos le quedan?, y ahora siga dándome de 3

en 3». Un punto por cada sustracción independiente correcta. Ejemplo: 27-23-20-17-15: 3 puntos (27, 20 y 17). Máximo 5 puntos.

Repetir los dígitos hacia atrás: únicamente puntúa la repetición a la inversa, no la directa que ha de repetir hasta que se aprenda los 3 dígitos. Cada dígito colocado en el orden inverso adecuado es 1 punto. Máximo 3 puntos (2-9-5).

Memoria diferida: por cada palabra que recuerde (dejarle tiempo suficiente), 1 punto. Máximo 3 puntos.

Lenguaje y praxis:

Repetir la frase: 1 punto si la repite correctamente en el primer intento (si se equivoca en 1 sola letra ya es 0 puntos).

Semejanzas: 1 punto por cada respuesta correcta. La única respuesta correcta para rojo y verde es colores; para perro y gato son válidas: animales, mamíferos, bichos, animales de 4 patas, etc. Máximo 2 puntos.

Órdenes verbales: coger el papel con la mano derecha: 1 punto; doblarlo como máximo 2 veces: 1 punto; ponerlo donde se le haya indicado (en condiciones normales en la consulta es encima de la mesa): 1 punto.

© Psiquiatría Editores, S.L.

Máximo 3 puntos.

2. Instrumentos de evaluación para los trastornos mentales orgánicos 7

Leer la frase: se aconseja tenerla escrita en letras de gran tamaño en una cartulina para facilitar la visión.

Indicarle que se ponga las gafas si las necesita, y que lo que le pedimos es que lea y haga lo que pone en la cartulina (como mucho decírselo 2 veces pero siempre antes de que empiece a leer, si ya ha leído la frase no debe decírsele lo que tiene que hacer). Si cierra los ojos sin necesidad de que se le insista que debe hacer lo que lee (da igual que lo lea en voz alta o baja) es 1 punto.

Escribir una frase: advertirle que no vale su nombre. Se le puede poner un ejemplo pero insistiéndole que la frase que escriba ha de ser distinta. Si escribe una frase completa (sujeto, verbo y objeto) es 1 punto.

Copiar el dibujo: al igual que con la lectura, se recomienda tener el dibujo a escala mayor en una cartulina aparte (puede ser en la cara de atrás de la cartulina con la frase). Los pentágonos dibujados

han de tener:

5 lados y 5 ángulos, y han de estar entrelazados entre sí con dos puntos de contacto, y formando un cuadrán-

gulo. El dibujo correcto vale 1 punto.

La puntuación total oscila entre 0 y 35 puntos.

Los puntos de corte recomendados por los autores aparecen en la tabla.

Ancianos Adultos

Probable déficit cognitivo global 0-23 0-27

Probable normal 24-35 28-35

*Fuente: Minimental State: A practical guide for grading the cognitive state of patients for the clinician.
J Psychiatr Res 1975; 12: 189-198*