

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Inventario Breve de Dolor (BPI)

Eje VI • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1 Identificación

Nombre	Inventario Breve de Dolor
Sigla	BPI
Autores	Cleeland, C. S., & Ryan, K. M.
Año	1994
Eje	EJE VI - SALUD FÍSICA, ESTILO DE VIDA Y MEDICINA CONDUCTUAL
Constructo principal	Dolor, fatiga y síntomas somáticos
Población	Adultos con dolor clínico o crónico
Tipo de instrumento	Cuestionario de autoinforme
Disponibilidad en español	Sí (Adaptación por Badia et al., 2003)
Acceso/licencia	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Nota curatorial de derechos	Protegido; solicitar/ordenar y respetar condiciones de MD Anderson.
Periodo temporal de referencia	Últimas 24 horas o última semana

2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Dolor, fatiga y síntomas somáticos. La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

Dominio conceptual	Salud física, estilo de vida y medicina conductual
Dimensiones declaradas	2 dimensiones: Severidad del dolor e Interferencia del dolor en el funcionamiento.

3 Características generales

Formato	Cuestionario de autoinforme
Población objetivo	Adultos con dolor clínico o crónico
Número de ítems	15 ítems
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Formato de respuesta	Escalas Numéricas (NRS) de 0 a 10 y porcentajes
Administración	No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial.
Tiempo estimado	5 a 10 minutos

4 Estructura

Dimensiones/ subescalas	2 dimensiones: Severidad del dolor e Interferencia del dolor en el funcionamiento.
Ítems	15 ítems
Control curatorial de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Respuesta	Escalas Numéricas (NRS) de 0 a 10 y porcentajes
Relación ítem- dimensión	No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.

5 Sistema de puntuación

Se promedian los ítems de Severidad (4 ítems) y de Interferencia (7 ítems).

Regla de corrección	Se promedian los ítems de Severidad (4 ítems) y de Interferencia (7 ítems).
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.
Baremos	No verificado en una fuente normativa autorizada.
Control de versión	No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población.

6 Interpretación

Severidad: 1-4 dolor leve, 5-6 moderado, 7-10 severo. Mide el impacto en actividad general, humor, marcha, trabajo, relaciones, sueño y disfrute de la vida.

Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.

7 Evidencia psicométrica

Elevada fiabilidad (alfas > .85). Es uno de los instrumentos más utilizados mundialmente para evaluar dolor oncológico y no oncológico.

Consistencia interna	No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.
Validez	Elevada fiabilidad (alfas > .85). Es uno de los instrumentos más utilizados mundialmente para evaluar dolor oncológico y no oncológico.
Fiabilidad temporal	No verificado en las fuentes disponibles.
Muestra y contexto	No verificado de forma suficiente para generalización.

8 Adaptaciones

Español	Traducción evaluada psicométrica y lingüísticamente.
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Versión exacta	Ledger curado disponible con 3 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.
Población/país	Adultos con dolor clínico o crónico
Alerta de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Advertencia	Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia.

9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Dolor, fatiga y síntomas somáticos en Adultos con dolor clínico o crónico, condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Cleeland, C. S., & Ryan, K. M.; 1994.
- Disponibilidad española reportada: Sí (Adaptación por Badia et al., 2003)
- Trazabilidad local: 0 archivo(s) técnicamente legible(s) y 1 PDF web verificado(s).

11 Limitaciones

- Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
- Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 0.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

13 Síntesis técnica

Constructo	Dolor, fatiga y síntomas somáticos
Población	Adultos con dolor clínico o crónico
Estructura	Catálogo: 15 ítems (incluye diagramas del cuerpo).; 2 dimensiones: Severidad del dolor e Interferencia del dolor en el funcionamiento.. Control curado: No fijado en el ledger estructurado.
Puntuación	Se promedian los ítems de Severidad (4 ítems) y de Interferencia (7 ítems).
Interpretación	Severidad: 1-4 dolor leve, 5-6 moderado, 7-10 severo. Mide el impacto en actividad general, humor, marcha, trabajo, relaciones, sueño y disfrute de la vida.
Estado de fuentes	Locales válidos: 0; web PDF: 1; aislados: 0.
Estado de uso	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Decisión técnica	Ficha documental disponible. La aptitud clínica requiere protocolo autorizado, versión fijada y verificación por profesional competente.

14 Referencias APA 7

Cleeland, C. S., & Ryan, K. M. (1994). Inventario Breve de Dolor.

Fuente de referencia del catálogo: MD Anderson Cancer Center.

<https://www.mdanderson.org/research/departments-labs-institutes/departments-divisions/symptom-research/symptom-assessment-tools/brief-pain-inventory.html>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8080219/>

https://static.elsevier.es/multimedia/00257753/0000012000000002/v0_201607121254/13042265/v0_201607121255/es/2v120n02a13042265pdf001.pdf?idApp=UINPBA00004N&text=

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.