

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Cuestionario de Disfunción Sexual Secundaria al Tratamiento con Psicofármacos (PRSexDQ-SALSEX)

Eje VI • Versión de trabajo: 10 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1. Identificación

Familia / sigla	PRSexDQ-SALSEX
Nombre completo	Cuestionario de Disfunción Sexual Secundaria al Tratamiento con Psicofármacos
Versión / edición	Versión original española (2000), heteroaplicada excepto ítem B.
Idioma	Español (original).
Autores	Montejo AL, García M, Espada M, Rico-Villademoros F, Llorca G, Izquierdo JA, y Grupo Español de Trabajo para el Estudio de las Disfunciones Sexuales Secundarias a Psicofármacos.
Año	2000
Tiempo estimado	10 minutos

2. Eje y pregunta clínica

Eje primario	EJE VI - SALUD FÍSICA, ESTILO DE VIDA Y MEDICINA CONDUCTUAL
Etiquetas	Salud sexual; disfunción sexual inducida por fármacos; psicofarmacología; medicina conductual.
Pregunta clínica que responde	¿Qué factores corporales/médicos/conductuales inciden?

3. Constructo, finalidad y usos

Constructo evaluado: disfunción sexual secundaria al tratamiento psicofarmacológico (deseo/interés sexual, retraso o incapacidad de eyaculación/orgasmo, dificultades de erección/lubricación, y grado de aceptación/molestia subjetiva por el cambio).

Finalidad: cribado clínico rápido, en entrevista, de disfunción sexual atribuible al tratamiento farmacológico en curso (antidepresivos, antipsicóticos y otros psicofármacos), para orientar decisiones de manejo (ajuste de dosis, cambio de fármaco, estrategias de afrontamiento).

Usos apropiados:

- Cribado clínico de disfunción sexual en pacientes bajo tratamiento psicofarmacológico, dentro de una entrevista estructurada.
- Monitorización longitudinal de efectos adversos sexuales durante el seguimiento farmacológico.
- Apoyo a la toma de decisiones sobre ajuste, cambio o mantenimiento del tratamiento, en conjunto con el criterio clínico.

Usos NO apropiados:

- Diagnóstico de disfunciones sexuales primarias no relacionadas con el tratamiento farmacológico (requiere evaluación sexológica específica).
- Autoaplicación sin la parte heteroadministrada (ítem B) prevista por los autores.
- Sustituto de evaluación médica/urológica/ginecológica cuando hay sospecha de causa orgánica no farmacológica.

4. Población, contexto, informante y modalidad

Población	Adultos en tratamiento psicofarmacológico (antidepresivos, antipsicóticos, otros), ambos sexos.
Contexto de aplicación	Clínico (psiquiatría, atención primaria, salud mental); seguimiento farmacológico.
Informante	Mixto: preguntas dirigidas al paciente, excepto el ítem B que contesta el entrevistador.
Modalidad de administración	Entrevista clínica estructurada (heteroaplicado).

5. Estructura y administración

Número de ítems	7 ítems (2 preliminares y 5 principales)
Periodo temporal de referencia	Desde que toma el tratamiento farmacológico
Formato de respuesta	Likert de 4 puntos (0-3) para ítems principales; categorías para ítems preliminares
Tiempo estimado de aplicación	No verificado en las fuentes consultadas (estimación editorial: 3-

	5 minutos, dada su brevedad).
--	-------------------------------

6. Dimensiones y puntuaciones

No se describen subescalas independientes: el cuestionario integra 5 áreas de contenido (deseo, eyaculación/orgasmo retrasado, incapacidad de eyaculación/orgasmo, erección/lubricación, y aceptación/molestia) en una puntuación total única de 0 a 15.

7. Sistema de puntuación

Regla de puntuación	Suma de los 5 ítems numerados (rango 0-15). El ítem 5 (aceptación) se puntúa igual que los demás pese a tener redacción distinta.
Ítems invertidos	No se identifican ítems inversos; los 5 ítems puntúan en el mismo sentido (mayor puntaje = mayor gravedad).
Ítems omitidos / reglas de omisión	No verificado en las fuentes consultadas.
Rango posible / puntos de corte	0-15. Leve: 1-5 (ningún ítem con puntaje ≥ 2). Moderada: 6-10 (algún ítem =2, ninguno =3). Intensa: 11-15, o bien cualquier ítem con puntaje =3. Fuente: Montejo et al. (2000), texto del propio protocolo.

8. Evidencia psicométrica en español / LatAm

Montejo AL et al. (2000), Actas Esp Psiquiatr 28(3):141-150: estudio de propiedades psicométricas del cuestionario en el Grupo Español de Trabajo para el Estudio de las Disfunciones Sexuales Secundarias a Psicofármacos. No se verificaron en esta sesión los coeficientes de fiabilidad/validez específicos del artículo (no se accedió al texto completo del artículo original, solo al protocolo mismo) — no verificado, consultar el artículo primario antes de citar cifras psicométricas exactas.

9. Adaptación cultural y norma local

Desarrollado directamente en población española; no se identificó adaptación específica para Latinoamérica en esta verificación. Es uno de los instrumentos de referencia en la psiquiatría de habla hispana para este constructo — no verificado el grado de uso normativo en LatAm.

10. Límites clínicos, seguridad, derivación y no-diagnóstico

- Instrumento de cribado de un efecto adverso específico (disfunción sexual farmacógena), no una evaluación sexológica integral.
- Requiere entrevista clínica; no diseñado como autoinforme independiente por el ítem B heteroaplicado.
- No sustituye evaluación médica cuando se sospeche etiología orgánica no farmacológica.
- No emplear como único fundamento de decisiones de cambio de tratamiento; integrar con juicio clínico y preferencias del paciente.
- No se localizaron normas ni puntos de corte diferenciados por sexo, edad o clase de fármaco en la verificación realizada.

11. Titular, licencia y condiciones de reproducción

El PRSexDQ-SALSEX es un instrumento de circulación clínica y académica amplia en la literatura psiquiátrica en español, reproducido en numerosos artículos, tesis y guías de práctica clínica; no se identificó editorial comercial que restrinja su uso académico/asistencial no comercial citando la fuente (Montejo AL et al., 2000, Actas Esp Psiquiatr). El Protocolo.pdf de este acervo es copia directa (sin remaquetar) de un PDF con capa de texto ya presente en el acervo local del proyecto, verificado mediante extracción de texto (pypdf).

12. DOI / URL oficiales y referencias APA

Montejo AL, García M, Espada M, Rico-Villademoros F, Llorca G, Izquierdo JA, y Grupo Español de Trabajo para el Estudio de las Disfunciones Sexuales Secundarias a Psicofármacos (2000). Propiedades psicométricas del Cuestionario de Disfunción Sexual Secundaria a Psicofármacos. Actas Esp Psiquiatr, 28(3), 141-150.

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.

13. Activos disponibles, hash y estado QA

Activos disponibles	Protocolo.pdf (copia directa del PDF local con capa de texto, 1 página, íntegro). Ficha_Tecnica.docx / .pdf.
Hash / verificación	Ver MANIFIESTO_SHA256.csv del proyecto (generado por proceso externo posterior a esta entrega).
Estado QA	Protocolo local abre correctamente

	y contiene el cuestionario completo (verificado con pypdf, 2927 caracteres extraídos). Requiere revisión humana antes de uso clínico formal.
--	--

14. Control de versión

Fecha	2026-08-10
Responsable	Claude — proceso automatizado, requiere revisión humana
Versión de la ficha	1.0