

SAS — Escala de Acatisia de Simpson-Angus (Simpson-Angus Scale, SAS)

Administración: Heteroaplicada

N.º de ítems: 10

Descripción, corrección e interpretación (texto íntegro de la fuente):

La SAS es un instrumento de 10 ítems utilizado para evaluar la presencia y gravedad de la sintomatología parkinsoniana.

Es la escala de evaluación más utilizada para el parkinsonismo en los ensayos clínicos en los pasados 25 años.

Existe una versión breve que valora parkinsonismo, expresión facial, temblor, acinesia y rigidez (4 ítems), acatisia (1 ítem) y distonía (1 ítem).

CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN

Los 10 ítems están enfocados en evaluar tanto la rigidez como la bradicinesia, y no evalúan la rigidez subjetiva o el enlentecimiento.

Los ítems son evaluados con una escala de gravedad de 0 a 4, con definiciones para cada puntuación.

© Psiquiatría Editores, S.L.

11. Instrumentos de evaluación de efectos adversos 145

11.4. Escala de Movimientos Involuntarios Anormales (Abnormal Involuntary Movement Scale, AIMS)

Autor W. Guy.

Referencia ECDEU Assessment Manual for Psychopharmacology, revised ed. Washington: US

Department of Health, Education, and Welfare, 1976.

Evalúa Acatisia inducida por fármacos. Apropiaada para evaluar pacientes con enfermedades

psiquiátricas graves que pueden presentar movimientos discinéticos, habitualmente como consecuencia de tratamiento antipsicótico.

N.º de ítems 12.

Administración Heteroevaluada.

DESCRIPCIÓN

La AIMS es un instrumento de 12 ítems que evalúa los movimientos involuntarios

asociados con fármacos anti-psicóticos, tanto la distonía tardía y la acatisia crónica como la alteración motora «espontánea» debida a la propia enfermedad.

La puntuación de la AIMS consiste en valorar, en los primeros 6 ítems, la gravedad de los movimientos en tres

grandes áreas anatómicas (facial/oral, extremidades y tronco).

Además hay 3 ítems para emitir un juicio global y otros dos sobre el estado dental.

CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN

La puntuación está basada en una escala de 5 puntos, que oscila entre 0 (no) y 4 (grave).

Fuente: A rating scale for extrapyramidal side effects. Acta Psychiatr Scand 1970; 212 (Suppl 44): 11-19