BASE INSTRUMENTAL · EJE I: PROBLEMAS, SÍNTOMAS Y RIESGO

INVENTARIO DE ANSIEDAD DE BECK

(Beck Anxiety Inventory — BAI)

Beck, A. T., Epstein, N., Brown, G., & Steer, R. A. (1988). • Adaptación española: Sanz, J., & Navarro, M. E. (2003).

Nombre y Apellido:	**Edad:**	**Fecha:**
Evaluador / Institución:	**Sexo:** ☐ F ☐ M	**N° H.C. / Cód.:**

INSTRUCCIONES: A continuación aparece una lista de síntomas comunes de ansiedad. Lea atentamente cada uno e indique cuánto le ha afectado durante la última semana, incluyendo hoy:

0 = En absoluto | 1 = Levemente (no me molestó mucho) | 2 = Moderadamente (fue muy desagradable) | 3 = Severamente (casi no pude soportarlo)

N°	Síntoma de ansiedad:	0 En absoluto	1 Levemente	2 Moderado	3 Severo
1	Hormigueo, entumecimiento o adormecimiento en partes del cuerpo.	☐	☐	☐	☐
2	Sensación de calor o sofocación.	☐	☐	☐	☐
3	Temblor o debilidad en las piernas.	☐	☐	☐	☐
4	Incapacidad para relajarse.	☐	☐	☐	☐
5	Miedo a que suceda lo peor.	☐	☐	☐	☐
6	Sensación de mareo, aturdimiento o vahído.	☐	☐	☐	☐
7	Palpitaciones o aceleración del ritmo cardíaco (taquicardia).	☐	☐	☐	☐
8	Sensación de inestabilidad o inseguridad física.	☐	☐	☐	☐
9	Terror, miedo intenso o pánico.	☐	☐	☐	☐
10	Nerviosismo o inquietud interior.	☐	☐	☐	☐
11	Sensación de ahogo o dificultad para tragar aire.	☐	☐	☐	☐
12	Temblores en las manos.	☐	☐	☐	☐
13	Estremecimiento, temblor general o agitación motora.	☐	☐	☐	☐
14	Miedo a perder el control o a descontrolarse.	☐	☐	☐	☐
15	Dificultad o esfuerzo para respirar.	☐	☐	☐	☐
16	Miedo a morir.	☐	☐	☐	☐
17	Sobresaltos frecuentes o asustarse fácilmente.	☐	☐	☐	☐
18	Molestias estomacales, indigestión o dolor abdominal.	☐	☐	☐	☐
19	Sensación de palidez o desvanecimiento.	☐	☐	☐	☐
20	Rubor facial o enrojecimiento repentino de la cara.	☐	☐	☐	☐
21	Sudoración profusa no debida al calor ambiental.	☐	☐	☐	☐

NORMAS DE CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN CLÍNICA (Rango 0 a 63 puntos):

• **0–7 puntos:** Nivel de ansiedad mínimo o normal. • **8–15 puntos:** Ansiedad leve (predominio somático o reactivo). • **16–25 puntos:** Ansiedad moderada (significación clínica evidente). • **26–63 puntos:** Ansiedad severa / estado de crisis. *Estructura bifactorial: Subescala Somática (ítems 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21) y Subescala Afectivo-Cognitiva (ítems 4, 5, 9, 10, 14, 16, 17).*

psico·flujo · Instrumento compuesto para uso libre en evaluación psicológica. Adaptación de Sanz & Navarro (2003).