# ESCALA DE TRAUMA DE DAVIDSON (DTS)

*Davidson Trauma Scale — Autoinforme de Frecuencia y Gravedad de Síntomas de TEPT*

Jonathan R. T. Davidson et al. (1997) • Adaptación española validada por Bobes et al.

**Nombre / Código:** _____ **Fecha:** _____

**Edad:** _____ años **Sexo:** [ ] F [ ] M [ ] Otro **Evaluador:** _____

**INSTRUCCIONES:**

Autoaplicada tras identificar el trauma más perturbador. Valore cada síntoma en la última semana indicando la FRECUENCIA (0=Nunca a 4=A diario) y la GRAVEDAD (0=Nada a 4=Extrema):

**Frecuencia (F):** 0=Nunca, 1=A veces, 2=2-3 veces, 3=4-6 veces, 4=A diario | **Gravedad (G):** 0=Nada, 1=Leve, 2=Moderada, 3=Marcada, 4=Extrema

| Nº | Síntoma Nuclear de TEPT (Última Semana) | Frec. | Grav. | F + G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¿Ha tenido imágenes, recuerdos o pensamientos dolorosos del acontecimiento traumático? (Intrusión) | | | |
| 2 | ¿Ha tenido pesadillas o sueños desagradables sobre el acontecimiento? (Intrusión) | | | |
| 3 | ¿Ha sentido como si el acontecimiento estuviera ocurriendo de nuevo [reviviscencia]? (Intrusión) | | | |
| 4 | ¿Le ha molestado intensamente alguna situación o estímulo que le haya recordado el hecho? (Intrusión) | | | |
| 5 | ¿Ha tenido manifestaciones físicas por recuerdos del trauma (sudores, taquicardia, temblor)? (Intrusión) | | | |
| 6 | ¿Ha estado evitando pensamientos, sentimientos o recuerdos vinculados al acontecimiento? (Evitación) | | | |
| 7 | ¿Ha estado evitando actividades, lugares o personas que le recordaran el acontecimiento? (Evitación) | | | |
| 8 | ¿Ha sido incapaz de recordar partes importantes de lo sucedido? (Evitación / Bloqueo) | | | |
| 9 | ¿Ha tenido marcada dificultad para disfrutar de las cosas que antes le gustaban? (Embotamiento) | | | |
| 10 | ¿Se ha sentido distante o alejado de los demás? (Embotamiento) | | | |
| 11 | ¿Ha sido incapaz de experimentar afecto o sentimientos de ternura? (Embotamiento) | | | |
| 12 | ¿Ha tenido dificultad para imaginar un futuro normal o cumplir sus objetivos vitales? (Embotamiento) | | | |
| 13 | ¿Ha tenido dificultad para iniciar o mantener el sueño? (Hiperactivación) | | | |
| 14 | ¿Ha estado irritable o ha tenido accesos repentinos de ira? (Hiperactivación) | | | |
| 15 | ¿Ha tenido problemas para concentrarse en sus tareas cotidianas? (Hiperactivación) | | | |
| 16 | ¿Se ha sentido nervioso, hiperalerta o permanentemente en guardia? (Hiperactivación) | | | |
| 17 | ¿Se ha asustado fácilmente o ha tenido reacciones de sobresalto exageradas? (Hiperactivación) | | | |

**PUNTUACIÓN TOTAL, SUBESCALAS Y CRIBADO (Davidson et al., 1997)**

**Puntuación Global (0 - 136 puntos):**
- Suma total de Frecuencia (0-68) + Gravedad (0-68).
- **Punto de corte diagnóstico:** Puntuación total $\geq 40$ **puntos** predice el diagnóstico de TEPT con Sensibilidad del 88% y Especificidad del 83%.

**Subescalas de Síntomas DSM-IV:**
- **Intrusión / Reexperimentación (ítems 1 a 5):** 0 a 40 puntos.
- **Evitación y Embotamiento afectivo (ítems 6 a 12):** 0 a 56 puntos.
- **Hiperactivación fisiológica (ítems 13 a 17):** 0 a 40 puntos.
- Criterio de respuesta: Reducción $\geq 50\%$.