



## 7.2. Escala Breve de Ansiedad de Tyrer (Brief Scale for Anxiety, BSA)

1. *Tensión interna* (representando sentimientos de incomodidad mal definidos, inquietud, confusión interna, tensión mental llegando a pánico, terror y angustia. Clasificar según la intensidad, frecuencia, duración y extensión)
  0. Apacible. Solamente tensión interna pasajera.
  2. Sentimientos ocasionales de inquietud e incomodidad mal definidos
  4. Sentimientos continuos de tensión interna, o intermitente que el/la paciente puede controlar con cierta dificultad
  6. Terror o angustia sin ceder
2. *Sentimientos de hostilidad* (representando cólera, hostilidad y sentimientos de agresión sin considerar si se actúa sobre ellos o no. Clasificado según intensidad, frecuencia y la cantidad de provocación tolerada)
  0. No es fácilmente provocado
  2. Fácilmente provocado. Comunica sentimientos de hostilidad que son fácilmente disipados
  4. Reacciona a la provocación con cólera y hostilidad excesiva
  6. Cólera persistente, rabia u odio intenso que es difícil o imposible de controlar
3. *Hipocondriasis* (representando preocupación exagerada o preocupación no real sobre estar enfermo o la enfermedad. Distinguir entre la preocupación sobre cosas de poca importancia y dolores)
  0. No preocupación sobre estar enfermo
  2. Reaccionando a la menor disfunción del cuerpo con presagio. Temor o fobia exagerados a la enfermedad
  4. Convencido de que hay alguna enfermedad pero puede ser tranquilizado, solamente por un período breve
  6. Convicciones hipocondríacas absurdas e incapacitantes (se le pudre el cuerpo, las tripas no han funcionado durante meses)
4. *Preocupación por pequeñas cosas* (representando aprensión y preocupación excesiva por pequeñas cosas que es difícil de parar y que no guarda proporción con las circunstancias)
  0. Ninguna preocupación en concreto.
  2. Preocupación excesiva, que no puede quitarse de encima
  4. Aprensivo o preocupado por pequeñas cosas o rutinas cotidianas de poca importancia
  6. Preocupación que no cesa o dolorosa. El consuelo es ineficaz
5. *Fobias* (representando sentimientos de fobia/temor no razonable en situaciones específicas [como el autobús, el supermercado, la multitud, sentirse encerrado, estar solo] que son evitados si es posible)
  0. Ninguna fobia
  2. Sentimientos de malestar vago en situaciones que pueden ser dominadas sin ayuda o tomar precauciones simples como evitar la hora punta cuando es posible
  4. Ciertas situaciones provocan malestar marcado y se evitan sin perjudicar el rendimiento social
  6. Fobias incapacitantes que restringen gravemente las actividades, por ejemplo, completamente incapaz de salir de casa.
6. *Sueño reducido* (representando una experiencia subjetiva de duración o profundidad del sueño reducidos comparado con el propio patrón normal del sujeto cuando está bien)
  0. Duerme como siempre
  2. Ligera dificultad en coger el sueño o sueño ligero levemente reducido
  4. El sueño está reducido o interrumpido por lo menos 2 horas
  6. Menos de 2 o 3 horas de sueño
7. *Perturbación autonómica* (representando descripciones de palpitaciones, dificultades en respirar, mareos, sudor incrementado, manos y pies fríos, boca seca, diarrea, micción frecuente. Distinguir de tensión interna y dolores)
  0. Ninguna perturbación autonómica
  2. Síntomas autonómicos ocasionales que ocurren bajo estrés emocional
  4. Alteraciones autonómicas intensas o frecuentes que están experimentadas como incomodidad o inconveniente social
  6. Alteraciones autonómicas muy frecuentes que interrumpen otras actividades o son incapacitantes.
8. *Dolores* (representado por comunicación de malestar corporal, dolores. Clasificar según intensidad, frecuencia o duración, y alguna petición para el alivio. No considerar cualquier síntoma de causa orgánica. Distinguir de hipocondriasis, perturbación autonómica y tensión muscular)
  0. Dolores ausentes o transitorios
  2. Dolores ocasionales definitivos
  4. Dolores inconvenientes y prolongadas. Peticiones de analgésicos efectivos
  6. Dolores muy intensos o que interfieren gravemente
9. *Alteraciones autonómicas* (representando signos de disfunción autonómica, hiperventilación o suspiros frecuentes, rubor, sudor, manos frías, pupilas dilatadas, boca seca y desmayo)
  0. Alteraciones autonómicas no observadas
  2. Alteraciones autonómicas leves u ocasionales tal como ruborizarse o palidecer o sudar bajo estrés
  4. Alteración autonómica obvia en varias ocasiones incluso cuando no está bajo estrés
  6. Alteraciones autonómicas que interfieren con la entrevista
10. *Tensión muscular* (representando tensión muscular observada como mostrada por la expresión facial, la postura y los movimientos)
  0. Parece relajada
  2. Cara y postura ligeramente tensa
  4. Cara y postura moderadamente tensa (fácilmente visto en la mandíbula y músculos del cuello. Parece que no puede encontrar una posición relajada cuando está sentado)
  6. Marcadamente tenso. A menudo se sienta encorvado o agachado o en tensión o rígidamente recto al borde de la silla