



3.7. Escala de la Intensidad de la Dependencia al Alcohol (EIDA)

1

Intente recordar un período de tiempo en los últimos 6 meses en los que usted haya bebido mucho. Ahora marque (X) en la casilla correspondiente la frecuencia con que las siguientes manifestaciones le ocurrieron durante ese período.

Durante ese período de tiempo que bebía mucho:

	<i>Nunca o casi nunca (0)</i>	<i>A veces (1)</i>	<i>Frecuentemente (2)</i>	<i>Casi siempre (3)</i>
1. Me despertaba sudando	☐	☐	☐	☐
2. Me temblaban las manos a primera hora de la mañana	☐	☐	☐	☐
3. Tenía náuseas a primera hora de la mañana	☐	☐	☐	☐
4. Todo mi cuerpo temblaba violentamente si no bebía algo	☐	☐	☐	☐
5. Me despertaba completamente bañado en sudor	☐	☐	☐	☐
6. Temía que llegase la hora de levantarme	☐	☐	☐	☐
7. Temía encontrarme con alguien a primera hora de la mañana	☐	☐	☐	☐
8. Me sentía próximo a la desesperación al despertarme	☐	☐	☐	☐
9. Me sentía muy nervioso al despertarme	☐	☐	☐	☐
10. Me sentía asustado al despertarme	☐	☐	☐	☐
11. Me gustaba beber alcohol por la mañana	☐	☐	☐	☐
12. Tenía ganas de beber alcohol al despertarme	☐	☐	☐	☐
13. Me tomaba lo antes posible y de un trago las primeras copas de la mañana	☐	☐	☐	☐
14. Bebía por la mañana para calmar los temblores	☐	☐	☐	☐
15. Sentía una fuerte necesidad de beber alcohol al despertarme	☐	☐	☐	☐
16. Bebía más de 4 copas de licor al día (el equivalente es una botella de vino u 8 cañas de cerveza)	☐	☐	☐	☐
17. Bebía más de 8 copas de licor al día (el equivalente son 2 botellas de vino o 16 cañas de cerveza)	☐	☐	☐	☐
18. Bebía más de 16 copas de licor al día (el equivalente son 3 1/2 botellas de vino o 32 cañas de cerveza)	☐	☐	☐	☐
19. Bebía más de 32 copas de licor al día (el equivalente son 7 botellas de vino o 64 cañas de cerveza)	☐	☐	☐	☐
20. Llegaba a beber en menos de 1 hora 8 copas de licor (el equivalente son 2 botellas de vino o 18 cañas de cerveza)	☐	☐	☐	☐
21. Después de haber tomado algunas copas me apetecía seguir bebiendo	☐	☐	☐	☐
22. Cuando comenzaba a beber me resultaba muy difícil parar hasta que no estaba bastante bebido	☐	☐	☐	☐
23. No bebía alcohol hasta después de haber finalizado mis tareas (trabajo, estudio, reuniones, etc.)	☐	☐	☐	☐
24. Si bebía alcohol, no sobrepasaba el límite que me había propuesto	☐	☐	☐	☐
25. Había días en los que conseguía no beber nada	☐	☐	☐	☐

Imagínese la siguiente situación:

- (1) Ha conseguido dejar de beber durante algunas semanas.
 (2) Y tiene una recaída en la que bebe bastante durante 2 días consecutivos.

¿Cómo se sentiría por la mañana, después de haber pasado esos 2 días bebiendo bastante?

	<i>Nada (0)</i>	<i>Un poco (1)</i>	<i>Moderadamente (2)</i>	<i>Bastante (3)</i>
26. Por la mañana comenzaría a sudar	☐	☐	☐	☐
27. Tendría temblor en las manos	☐	☐	☐	☐
28. Tendría náuseas	☐	☐	☐	☐
29. Mi cuerpo temblaría	☐	☐	☐	☐
30. Mis deseos por beber serían	☐	☐	☐	☐

Puntuación total: _____

Las preguntas 23 a 25 puntúan en sentido inverso.