



3.6. Cuestionario sobre la Gravedad de la Dependencia al Alcohol (Severity of Alcohol Dependence Questionnaire, SADQ)

1

En los últimos 6 meses, durante el período de tiempo en que bebía mucho:

	<i>Nunca o casi nunca (0)</i>	<i>A veces (1)</i>	<i>Frecuentemente (2)</i>	<i>Casi siempre (3)</i>
1. Me despertaba sudando	☐	☐	☐	☐
2. Tenía palpitaciones a primera hora de la mañana	☐	☐	☐	☐
3. Me temblaban las manos a primera hora de la mañana	☐	☐	☐	☐
4. Tenía náuseas a primera hora de la mañana	☐	☐	☐	☐
5. Todo mi cuerpo temblaba violentamente, si no bebía algo	☐	☐	☐	☐
6. Me despertaba completamente bañado en sudor	☐	☐	☐	☐
7. Vomitaba a primera hora de la mañana	☐	☐	☐	☐
8. Temía que llegase la hora de levantarme	☐	☐	☐	☐
9. Temía encontrarme con alguien a primera hora de la mañana	☐	☐	☐	☐
10. Me encontraba a disgusto al despertarme por la mañana	☐	☐	☐	☐
11. Me sentía próximo a la desesperación al despertarme	☐	☐	☐	☐
12. Me sentía aturdido al despertarme	☐	☐	☐	☐
13. Me sentía muy nervioso al despertarme	☐	☐	☐	☐
14. Me sentía asustado al despertarme	☐	☐	☐	☐
15. Me gustaba beber alcohol por la mañana	☐	☐	☐	☐
16. Me aseguraba de que me quedara algo de alcohol para por la mañana	☐	☐	☐	☐
17. Tenía ganas de beber alcohol al despertarme	☐	☐	☐	☐
18. Me tomaba lo antes posible y de un trago las primeras copas de la mañana	☐	☐	☐	☐
19. Consumía por lo menos 4 copas de licor durante la hora siguiente a haberme levantado (el equivalente es una botella de vino o 9 cañas de cerveza)	☐	☐	☐	☐
20. Bebía por la mañana para calmar los temblores	☐	☐	☐	☐
21. Sentía una fuerte necesidad de alcohol al despertarme	☐	☐	☐	☐
22. Bebía más de 4 copas de licor al día (el equivalente es una botella de vino o 9 cañas de cerveza)	☐	☐	☐	☐
23. Bebía más de 8 copas de licor al día (el equivalente son 2 botellas de vino o 18 cañas de cerveza)	☐	☐	☐	☐
24. Bebía más de 16 copas de licor al día (el equivalente son 4 botellas de vino o 36 cañas de cerveza)	☐	☐	☐	☐
25. Bebía más de 32 copas de licor al día (el equivalente son 8 botellas de vino o 72 cañas de cerveza)	☐	☐	☐	☐
26. Llegaba a beber en menos de 1 hora 8 copas de licor (el equivalente son 2 botellas de vino o 18 cañas de cerveza)	☐	☐	☐	☐
27. Llegaba a beber en menos de 1 hora 16 copas de licor (el equivalente son 4 botellas de vino o 36 cañas de cerveza)	☐	☐	☐	☐

Si tras varias semanas de abstinencia tiene una recaída durante la cual pasa dos días bebiendo en exceso, ¿cómo se encontraría a la mañana siguiente a esos dos días?

3.6. Cuestionario sobre la Gravedad de la Dependencia al Alcohol (Severity of Alcohol Dependence Questionnaire, SADQ)

2

	<i>Nada (0)</i>	<i>Un poco (1)</i>	<i>Moderadamente (2)</i>	<i>Bastante (3)</i>
28. Por la mañana comenzaría a sudar	☐	☐	☐	☐
29. Tendría palpitaciones	☐	☐	☐	☐
30. Tendría temblor en las manos	☐	☐	☐	☐
31. Tendría náuseas	☐	☐	☐	☐
32. Mi cuerpo temblaría	☐	☐	☐	☐
33. Mis deseos por beber serían	☐	☐	☐	☐

Puntuación total: _____