

BASE INSTRUMENTAL · EJE I

Escala de 8 Ítems para Resultados del Tratamiento del TEPT (TOP-8)

Davidson, J. R. T., & Colket, J. T. (1997)

Validación y distribución: CIBERSAM (Ficha Id=45)

Nombre y apellido:

Edad:

Fecha:

Evaluable / Institución:

Sexo: ☐ M ☐ F

Código / N° H.C.:

Instrucciones: Valore en qué medida cada síntoma le ha molestado durante la última semana en relación con el suceso traumático.

0 = Nada | 1 = Leve | 2 = Moderado | 3 = Grave | 4 = Extremadamente grave

N°	Ítem / Enunciado	0	1	2	3	4
1	Imágenes dolorosas, pensamientos o recuerdos no deseados del acontecimiento traumático	☐	☐	☐	☐	☐
2	Respuestas físicas (sudoración, temblor, palpitaciones) ante recordatorios del suceso	☐	☐	☐	☐	☐
3	Evitar pensamientos o sentimientos que le recuerden el acontecimiento	☐	☐	☐	☐	☐
4	Evitar actividades, lugares o personas que le recuerden el acontecimiento	☐	☐	☐	☐	☐
5	Problemas o dificultades para conciliar o mantener el sueño	☐	☐	☐	☐	☐
6	Sentimientos de irritabilidad o arrebatos de enfado	☐	☐	☐	☐	☐
7	Dificultades notorias para concentrarse	☐	☐	☐	☐	☐
8	Estar hipervigilante, en guardia constante o asustarse fácilmente	☐	☐	☐	☐	☐

Puntuación y corrección: Rango total: 0 a 32 puntos. Puntos de corte: 0–7 ausencia de TEPT; ≥ 12 probable trastorno por estrés postraumático.

Hoja compuesta por psico-flujo (Facultad de Filosofía, Universidad Nacional del Este) a partir de la fuente citada. Los ítems pertenecen a sus autores. No reproduce material de ninguna editorial.