



11.1. Cuestionario de Síntomas de Retirada de Benzodiacepinas (Benzodiazepine Withdrawal Symptom Questionnaire, BWSQ)

1

Cada uno de los sentimientos listados debajo han sido descritos por algunas personas cuando ellos redujeron o retiraron sus tranquilizantes. Por favor, recuerde algunos de estos sentimientos que haya experimentado desde el inicio de su primer tratamiento con tranquilizantes poniendo una X en la casilla apropiada para cada ítem. Podría también indicar si estos sentimientos ocurrieron sólo cuando usted redujo la dosis o sus pastillas o si también ocurrieron si la dosis o pastillas era la misma.

	No	Sí, moderado	Sí, grave	Ocurre cuando se reducen o retiran las pastillas	Ocurre cuando las pastillas son las mismas
1. Sentimientos de irrealidad	☐	☐	☐	☐	☐
2. Muy sensible al ruido	☐	☐	☐	☐	☐
3. Muy sensible a la luz	☐	☐	☐	☐	☐
4. Muy sensible a los olores	☐	☐	☐	☐	☐
5. Muy sensible al tacto	☐	☐	☐	☐	☐
6. Sabor extraño en la boca	☐	☐	☐	☐	☐
7. Dolores musculares	☐	☐	☐	☐	☐
8. Contracciones musculares	☐	☐	☐	☐	☐
9. Sacudidas o temblores	☐	☐	☐	☐	☐
10. Hormigueos y pinchazos (en manos, brazos o piernas)	☐	☐	☐	☐	☐
11. Mareos	☐	☐	☐	☐	☐
12. Sentimientos de inestabilidad	☐	☐	☐	☐	☐
13. Sentirse enfermo/a	☐	☐	☐	☐	☐
14. Sentirse deprimido/a	☐	☐	☐	☐	☐
15. Molestias en los ojos	☐	☐	☐	☐	☐
16. Sensación de que las cosas se mueven cuando están quietas	☐	☐	☐	☐	☐
17. Ver o escuchar cosas que no existen (alucinaciones)	☐	☐	☐	☐	☐
18. Incapacidad de controlar sus movimientos	☐	☐	☐	☐	☐
19. Disminución de memoria	☐	☐	☐	☐	☐
20. Disminución de apetito	☐	☐	☐	☐	☐
Puntuación total ☐					
Cualquier otro síntoma (describir cada uno debajo)					
21.	☐	☐	☐	☐	☐
22.	☐	☐	☐	☐	☐
23.	☐	☐	☐	☐	☐
24.	☐	☐	☐	☐	☐

Instrucciones para la administración y puntuación del BWSQ. El cuestionario se aplica al paciente con una declaración introductoria indicando que está dirigido a los síntomas de abstinencia. El cuestionario es completado por el sujeto en presencia de un asesor y las cuestiones pueden ser preguntadas para dilucidar cada ítem.

Cada puntuación «moderado» se puntúa con 1 y cada «grave» con 2 siendo la puntuación máxima posible de 40, sin incluir los síntomas adicionales.

11.1. Cuestionario de Síntomas de Retirada de Benzodiacepinas (Benzodiazepine Withdrawal Symptom Questionnaire, BWSQ)

2

Cada uno de los sentimientos listados debajo han sido descritos por algunas personas cuando ellos redujeron o retiraron sus tranquilizantes. Por favor, recuerde algunos de estos sentimientos que haya experimentado en las pasadas 2 semanas poniendo una X en la casilla apropiada para cada ítem.

	No	Sí, moderado	Sí, grave
1. Sentimientos de irrealidad	☐	☐	☐
2. Muy sensible al ruido	☐	☐	☐
3. Muy sensible a la luz	☐	☐	☐
4. Muy sensible a los olores	☐	☐	☐
5. Muy sensible al tacto	☐	☐	☐
6. Sabor extraño en la boca	☐	☐	☐
7. Dolores musculares	☐	☐	☐
8. Contracciones musculares	☐	☐	☐
9. Sacudidas o temblores	☐	☐	☐
10. Hormigueos y pinchazos (en manos, brazos o piernas)	☐	☐	☐
11. Mareos	☐	☐	☐
12. Sentimientos de inestabilidad	☐	☐	☐
13. Sentirse enfermo	☐	☐	☐
14. Sentirse deprimido	☐	☐	☐
15. Molestias en los ojos	☐	☐	☐
16. Sensación de que las cosas se mueven cuando están quietas	☐	☐	☐
17. Ver o escuchar cosas que no existen (alucinaciones)	☐	☐	☐
18. Incapacidad de controlar sus movimientos	☐	☐	☐
19. Disminución de memoria	☐	☐	☐
20. Disminución de apetito	☐	☐	☐
Puntuación total ☐			
Cualquier otro síntoma (describir cada uno debajo)			
21.	☐	☐	☐
22.	☐	☐	☐
23.	☐	☐	☐
24.	☐	☐	☐

Instrucciones para la administración y puntuación del BWSQ. El cuestionario se aplica al paciente con una declaración introductoria indicando que está dirigido a los síntomas de abstinencia. El cuestionario es completado por el sujeto en presencia de un asesor y las cuestiones pueden ser preguntadas para dilucidar cada ítem.

Cada puntuación «moderado» se puntúa con 1 y cada «grave» con 2, siendo la puntuación máxima posible de 40, sin incluir los síntomas adicionales.